


Supp. A

£ 40 57.127/4



GEORGII FLOR. HENR.
BRÜNING.

PHILOS. & MED. DOCT. COM. PALAT.
CAES. SER. PRINC. REGN. HOHENL.
WALD. & SCHILL. CONSIL. AUL. & AR-
CHIAT. SER. & JLL. CAP. ESSEND. MED.
ADI. URB. JMP. ESSEND. PHYS. ALT.
ACAD. CÆS. NAT. CUR. COLL.

TRACTATUS
de
ICTERO SPASMODICO
INFANTUM

*Essendiae anno 1772 epidemico
accessit historia
Icteri Periodici Lethalis*



Vesalix et Lipsix
apud F. I. Roeder. et I. S. Heinsum 1773

4650564

GEORGE F. HENRY


BRUNING

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
125 WEST 47TH STREET
NEW YORK 17, N.Y.

TRACTS



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
125 WEST 47TH STREET
NEW YORK 17, N.Y.



Vol. 12, No. 1

Pub. S. J. Koster, et al. 2. March 1773

V I R O

I L L U S T R I

DOCTISSIMO EXPERIENTISSIMO

CHRISTIANO RUDOLPHO

H A N N E S

MEDICINÆ DOCTORI, PHYSICO VESALIENSI, ACADEMIÆ CÆSAREÆ NATURÆ CURIOSORUM, NEC NON SOCIETATIS SCIENTIARUM PRINCIPALIS HAS-SIACÆ, QUAE GIESSE FLORET, MEMBRO DIGNISSIMO.

S. P. D.

G. F. H. BRÜNING.



Quem Machaoniae artis pro-

A2

moto-

motorem indefessum, operatricis naturæ
 in morbis exploratorem gnavum, si-
 mulque amicum optatissimum colo, VIR
 CLARISSIME, COLLEGA PERDILECTE!

TIBI jam sacra funto, quæ de Morbi Ar-
 quati specie hac singulari spasmodica im-
 præsentiarum differere mecum constitui.
 Diu jam est, quod publicum aliquod
 mei erga TE amoris exhibendum spe-
 cimen fui meditatus. Ansam præsen-
 tis dedisti IPSE.

Venit ad manus, quem de insitione
variolarum in urbe patria Vesaliensi tenta-
tata,

zata nuper edideras, pulcherrimus tractatus, Illustriſſimo Academiae Imperialis Naturæ Curioſorum Præſidi, meritiffimo BAIERO adſcriptus, obſervationibus perquam utilibus, varioque eruditionis apparatu inſignis. Inſerueras huic meam de reditu variolarum verarum ſententiam, politam minus, quam quæ publico operi, cui deſtinata non erat, inferi meruiſſet. Ingratum ergo nec TIBI nec Lectori futurum, arbitror, ſi, quid in genere de variolis, earum inſitione, ſiſque medendi methodo ſentiam, hic

præfationis loco exsequar.!

Arduaam, Amice! suscepisti exornandam spartam, vexatissimum denuo thema ventilans, quod a pluribus jam retro annis per totum literatum orbem Eridos quasi pomum fuit, in quo vel defendendo, vel impugnando, a Wolga ad Thamesin, ab Hellesponto ad Balticum mare, a Roma ad Canadam usque nullus fere alicujus famæ Medicus non defudavit, absque quod in hunc usque diem evictum ab alterutra parte sit, utrum ex hoc Circassæ dono redund-

verit

verit in humanum genus vel damnum
vel utilitas.

Steterunt a partibus infitionis Medici
illustres, *De Beaux, Bernouilli, Ber-
zi, Blandfort, Brooke, Brown, Bur-
ges, Butini, le Cat, Camper, Chastellux,
de la Condamine, David, Dimsdale,
Dodart, Gatti, Gilchrist, Harris, Ha-
dow, Hensler, Hesty, Kirkpatrik, des
Landes, Lobb, Locher, Mead, Maty,
Mowro, Morissot, Pajon des Moncets,
Pizzorno, Pouteau, Ramby, Razoux,
Rosenstein, Roux, Schinz, Sutton, Tar-*

*gioni Tozzetti, Tissot, Trulles, Trois-
chin, Vernage, &c. &c. Integro
cohors !*

*Impugnarunt illam ex Medicis viri non
minus celebres: Astruc, Baron, Bian-
chi, Eques St. Michaelis Bouvart, Iero-
me Carné, l' Epine, Eschenbach, de Ham,
Comes de Lauraguais, le Hoc, Mar-
quart, Verdelban des Moles, d' Origny,
Planci, Paulet, Rast junior, Comes Ron-
calli Parolino, Santivali, Timony, Za-
netti, multique præter hos alii, quo-
rum scripta vidisse non obigit.*

Neque ſinter Medicos ſolum recipro-
cata hæc contentionis ſerra eſt: Theo-
logi quoque, Philoſophi, Politici, Ca-
meraliſtæ, infimaque tandem inſectorum
ſcribaciũ turba, pro varia quam pro-
ſitebantur ſcientia, vario ingenii modu-
lo, varia eventuum ſibi cognitorum for-
tuna, vario erga operatorem quendam
ſpeciali vel amore vel odio, ſubinde
quoque vel ex ſola diſputandi petulan-
tia, in varias partes ita diripiebantur,
ut ab una parte tanquam optatiſſimum
ex divina miſericordia humano generi

largitum donum inoculationem variolarum deprædicarent; ab altera vero, totum hoc negotium tanquam illicitum, religioni christianæ adversum, et rei publicæ manifesto noxium damnarent, auxilia ab exteris peterent, subsidia denique Regum et Magistratum implorarent, ad suffocandam in cunabulis suis nefandam hanc præsentis et futuri sæculi certissimam pestem.

Forte facilius erit, ferre in re tam controversa iudicium, si de quæstionibus subnexis prius convenerimus.

Dis.

Disputatur I. An re vera variolæ naturales per se adeo lethiferæ sint, ut secundum computa nonnullorum a benignis sextus vel septimus; a malignis vero quartus ordinario pereat?

II. An variola morbus sit absolute necessarius, sic ut nemo mortalium ab illo immunis manere possit?

III. An, qui semel variolis veris laboraverunt, eodem hoc morbo corripī denuo possint?

IV. An reapse ex infectiis variolis pauciores per se moriantur, quam ex naturalibus, et cur?

V An

V. An simul cum veneno varioloso alius quoque morbus corpori sano communicari possit?

VI. An post inventam et in usum vocatam insitionem pauciores a variolis mortui sint, quam ante detectam hanc artem?

Sed quis Gordium hunc nodum solvet? Pernegat hic, quod ungue et rostro defendit alter. Provocat uterque ad experientiam quotidianam, ad capta toties experimenta, ad ipsam rationem sanam. Et quis contradicere rationi aude-

bit

bit emuncti nati homo? Tentandum,
quid ferant humeri.

Quæritur primo: *suntne variolæ naturales per se adeo periculosæ, ut quartus, quintus, vel septimus ad minimum ex illis pereat?* — Resp. Certum omnino est, variolas naturales, si corpora invadant talia, qualia ad infitionem eligi solent, sana, mollia, juvenilia, methodoque legitima, rationali tractentur, æque parum alere periculi, quam infitias. Notavit hoc passim in *Rationibus suis medendi Cl. Haemus*. Afferuit idem
illu-

illustrissimus L. B. *Smietemus* in datis
ad Facultatem Medicam Parisinam lite-
ris. Ipse *Gatti*, magnus ille et felix
inoculator, in Tractatu suo, cui titulus
*Reflexions sur les prejugsés, qui s' oppo-
sent au progrès et à la perfection de l' Ino-
culation*, largitur sponte, maximam par-
tem eorum, qui variolis veris natura-
libus occumbunt, opprimi sola Medi-
corum culpa; nunquam enim tantam
cladem variolas in tabernis rusticis ede-
re, quam inter nobiliores, qui medi-
corum præceptis adstricti sunt, J

confirmant capta in nosocomio *Sri Cyr* experimenta; ubi ex centum et duobus ægris, qui ex variolis naturalibus ibi decubuerunt, occubuit non nisi unus. Taceo meam, cujus in *Constitutione Epidemica Effendiensi* memini de variolis naturalibus, licet epidemicis, experientiam.

Alia omnino ratio est, si ab aëris acatastasia peregrina quædam morbo huic naturaliter benigno accedat malignitas; vel si miasma variolosum corpus fortuito occupet, succis impuris, corruptis, scatens. Quin et clima ipsum

ad malignitatem hujus morbi non exiguum punctum ferre observatis constat.

Quæstionem alteram: *an sint re vera homines, qui a variolis naturalibus per totum vitæ decursum immunes maneant?* experientia quotidiana affirmare omnino jubet. Morbus certo respectu hæreditarius variola est; quamquam per contagium generaliter communicetur. Sunt familiae, in quibus effræna malignitate furere solent variolæ. Sunt aliæ, in quibus per plures generationes benignissime esse consueverunt. Sunt denique,

que, in quibus perpauci variolis corripiuntur. Mihi ipsi cognita exempla sunt hominum, ad feram usque senectutem nullis unquam variolis vexatorum, quorum liberi et nepotes, dum hæc scribo, ab eodem hoc morbo manserunt intacti. Plures præterea et in ipsa hac urbe novi, qui, quamquam sæpius adfuerint variolosus, quamquam tractaverint curaverintque noctu diuque variolosos, quinimo cum ipsis cubuerint, nunquam tamen hunc morbum exinde lucrati sunt.

Quaritur tertio: *Recurruntne variolæ*

B

veræ?

veræ? Resp. Sunt qui affirmant; quinimo inter ipsos infitionis patronos. Exempla variolarum recidivantium passim exhibuit cl. *Haenius*. *Boerhaavius* et *Sydenhamus* secundæ; *Willisius* tertiæ infectionis meminit. Citat exemplum nutricis cujusdam *Sam. Dwight*, quæ post superatum bis variolosum morbum tertia vice ex confluentibus obierit. Dedit insuper variolarum secundariarum casus cl. *Marquart*. Celebris quoque *Gatti* illustrisque *Tissot* redire quidem, sed admodum raro variolas veras concedunt.

Con-

Conferri huc quoque poterunt *Robert*
Recherches sur la nature de l' Inocu-
lation, *Candide* f. le Hoc l' Avis sur l'
inoculation, *le Cat* lettre a Mfr. Pouteau,
Beer Differt. de exstirpatione vari-
olarum sub præsidio *Krausii*, *Rast* Re-
flexions sur l' inoculation de la petite
verole et sur les moyens qu'on pourroit
employer pour delivrer l' Europe de
cette maladie, *Timony*, Medici Constan-
tinopolitani, Diff. de inoculatione vario-
larum, *Paules* Histoire de la petite ve-
role, nec non *Eschenbach* Observat. an-
t.

rom. chirurg. medic. rariores &c. Omnes autem hi locis citatis recensiti casus manifesta laborant circa genium variolarum descriptarum incertitudine. Quas *Boerhaavius* et *Willisus* notant, recurrentes variolas, uterque præsens non vidit, quum prima vice hoc morbo decumberent ægri. Celebrem illam historiam juvenis illius Rhemensis *De la tour*, in vituperium artis insitoriae toties recoctam, variolis naturalibus post artificiales insitas affecti, refutavit in *Diariis Medicis* (*Journal de Medecine*)

el. *Van der Monde*: Hic enim rei novitate motus, ut percontari coram omnibus exacte posset, una cum collegis suis D. D. *Vernage*, *Fournier*, utroque *Petit*, et *St. Martin*, agrum hunc adiit videruntque omnes, spuris cum laborare variolis, aquosis, quarum nonnullæ pure laudabili plenæ imperitum et medicum vulgum fefellerant. Ad hanc variolarum classem referendæ omnino erunt et illæ, quas in se ipso expertus est *Behrens*, quarum nob. *Folzadry* meminit, quasque vel septies agrum

eundem invasisse viderunt *Borellus* et *Philippus de Violante*. Eadem hæc ratio videtur fuisse variolarum primarum, insititiarum, virginis illius Florentinæ, cujus *cl Haenius* in *Rat. Med. T. IX.* mentionem fecit, de quarum genuina indole non immerito jam dubitaverat *clar. Collin*; illarum denique, quarum historiam ex communicatione *Hartmanni* idem *Haenius* refert. Quam *Loeberus* in *Dissertatione* sua epistolari de reditu variolarum venditat. historia, ejusdem omnino comminatis est; facta enim jam hora

cente.

centesima secunda post infectionem variolarum eruptio manifestissime spuriam designat earundem naturam. Hinc est, quod *Bernouilli*, *Condamine*, *Mangetti*, *Monro*, *Razoux*, *Rosenstein*, alique in arte Præonia versati viri, variolas veras nunquam recurrere statuant; et quidem jure.

Vertitur totius rei cardo in hoc, ut probe distinguantur a variolis spuris veræ. Differunt inter se, qui de variolis ex professo egerunt Auctores, quoad signa earundem diagnostica, vanaque inveni, saltem insufficientia, plurima illa, ex

quibus veras a spuris dignoscere huc usque docebamur, criteria.

Pure vero, cocto, blando, impleri tertio post efflorescentiam plenariam die, variolis quidem veris solenne est: At spuriae quoque aqueas vesiculas elevant, lymphæ subinde vappida, subinde acris plenas, quæ tamen in corporibus robustis, maxime sub corticis febrifugii usu, in verum, blandum, coctumque pus sub regimine conveniente facile mutantur; ipsæque hic pustule spurie, si eoque loco suo inhereant, ut aere scere.

scere pus collectum, solvi in liquamen putridum, cutemque subjectam arrodere possit, cicatrices post se relinquunt, sæpe foedas. Confer hic cl. *Medici* epistolam ad cl. *Wolter* de possibili variorum extirpatione, vernacula lingua scriptam, nec non observationes cl. *Caluri*, quas de cicatricibus a variolis spuriiis progenitis in *Acta Senensia* inseruit Tom. I. a 1760. Definitum hoc a variolis spuriiis pus, sui generis morbum producit variolosum, spurium, si per infectionem corpori sano communicetur, eo-

dem modo, uti ab ichoribus, venerea lue, scabie, pariles morbos per pus vel ichorem transplantari quotidie videmus.

Corruit sic alterum illud variolarum verarum diagnosticon signum, a cl. *Vernage* datum: quod nempe desumptum a variolis spuris pus, si alio corpori inferatur, nullas unquam producere pustulas variolosas aptum sit. Contrarium permulta probant, in ægrotorum non leve damnum facta experimenta. Sic cl. *Wriesberg* in Dissertatione sua inaugurali, quam 1765 Goettingæ habuit, exem-

exemplum refert quinque infantum, quî anno 1758 a celebri *Rœderero* inoculati, quinquennio post veris demum variolis decubuerunt. Demonstrat hic ex primi morbi phænomenis Auctor, spurias solum ab infitione natas fuisse variolas. Similes casus paginæ antecedentes jam sistunt.

Nihilo tamen fecius medici Londinenses hanc cl. *Vernage* de variolarum spuriarum natura sententiam adoptasse videntur: Dum enim in *Transactionibus suis* vol. 1, art 25 rationes illas explicare nituntur, cur ab infitione interdum

dum nullæ excitentur variolæ? quum tamen sæpe breve post eadem subiecta per contagium naturale in morbum hunc incident, ad hanc *Vernagii* opinionem refugiunt, steriles ideo fuisse inoculationes hujusmodi, afferentes, quia a variolis spuris ad infectionem desumptum pus fuerit. Probabiliorem circa hoc phenomenon sententiam proferunt *cl. le Car et Pouteau*. Neque et eruptionis tempus infallibilem præbet variolarum verarum, naturalium, diagnosin. Tardius sæpe efflorescunt, vel propter adhibitam

medendi rationem, vel propter naturæ imbecillitatem, spuria; quum sub regimine calido, naturæ præcipitantia, aut veneni variolosi malignitate, veræ erumpant citius.

Unicum mihi variolarum verarum, ab omni contagio futuro certe emancipantium, signum illud est, ut, accedentibus simul reliquis variolarum genuinarum imperfectis licet signis, ab earundem eruptione, tempore durationis, morbi ipsius decursu, variolarum odore et habitu externo, puris natura, statuve epidemico defumtis, per uni-

ver-

versum corpus sibi similes ubique
appareant pustulae, nullaeque intermixtae
sint ex aquosarum vel acuminatarum
spuriarum classe. Spurias enim veris in
uno eodemque corpore eodem tempore
interpersas vidi nunquam.

Notandum in genere circa variolarum
recidivas:

- I. Recurrere omnino posse variolas spu-
rias easdem.
- II. Succedere sibi posse diversas spuri-
arum species
- III. Non ergo liberare spurias a spuriis.
- IV.

IV. Non liberare spurias variolas a veris.

V. Non liberare veras a spuris.

VI. Veras autem variolas a veris emancipare semper.

Non minus anceps est quarta, quæ ventilatur quæstio: *An ex variolis infectiis pauciores moriantur, quam a naturalibus?* Resp. Mori revera ex inoculatis unum et alterum, res est extra omnem dubitationis aleam posita. Septuagesimus ex inoculatis in Scotia communiter moritur, referente Monro, qui alio loco ex 5626 inoculatis 72 perisse notat.

Nona-

Nonagesimus nonus ex iis, quibus in Corsica a cl. *Stephano* variolæ per infectionem communicatæ fuerant, occubuit; idque tempore adeo malignæ ibi epidemix, ut solum in viciniis Curtæ, quæ mille trecentas ad summum familias capit, intra brevissimum temporis spatium 537 infantes a variolis naturalibus occubuerint. Centesimum trigésimum ex infectis obire vidit *Brocklesby*. Feliciori adhuc cum successu variolæ inoculavit *Sutherland*; hic enim a sexcentis, in quibus variolæ arte excitavit, uni-

cum

tum modo desideravit. Cl. *Blandfort* ex quadringentis a se inoculatis, vix unum, proprie a variolis enectum, gloriatur. Neque minus felix fuit infitionis, Nemaufii tentatæ, succesus. Ex omnibus enim ibi infitis, teste *Razoux* in epistola ad Dn. *Belletete*, interiit omnino nullus; pariter omnes quoque illi, qui anno 1750 Genævæ variolis artificialibus decubuerunt, sanitati redditi sunt, notante *Mary*.

Omnibus his si conferantur necrologiæ illorum, qui a variolis naturalibus exstingui solent, ingens profecto emera-

git differentia. Nonum vel decimum a variolis naturalibus in Suecia mori scribit ill. *Rosenstein*. Tertium vel quartum in exercitu Britannico, variolis spontaneis correptum, opprimi communiter, observavit laudatus sæpe jam *Brocklesby*; calculumque tam ex artificialibus quam ex naturalibus demortuorum, infitioni admodum faventem exhibuit *Bernouilli*. Apparet, me non monente, ceteris paribus, non posse, quin ex infititiis variolis moriantur pauciores, quam a naturalibus. *Primo enim*

ex unanimi artificum sententia, ad hanc operationem non admittenda sunt, nisi corpora puerilia, sana, mollia, nulla viscerum labe affecta. *Secundo* pus ipsum infitioni destinatum coctum, blandum, ex corporibus cetera sanis, variolis veris, benignis laborantibus, colligitur recens. *Tertio* ipsum anni tempus, vernum vel autumnale, aëris catastasis pura, ab omni epidemica constitutione vacua, corporis denique ipsius, operationi destinati dispositio, huic morbo aptissima, eligitur. *Quarto* venenum

ipsum variolosum illius indolis est, ut sanguini immediate admixtum, tantas turbas in corpore non creet, quam si vel inspiretur vel deglutiatur. In posteriori hoc casu, præter alia, ob temporis angustiam non recensenda mala, afficiuntur præ aliis partes illæ, quibus primum se adfixit contagii miasma; hinc pulmones, ventriculum, intestina, mesenterium subinde a variolis deturpata legimus. Qualia exempla memoriæ prodiderunt cl. *Schmiedel*, *Fernelius*, *Paræus*, *Rodericus a Castro*, *Horstius*, *Tho-*

mas

mas Bartholinus, Kerkringius, alii. Præparationem ipsam, quamquam a præcipuis jam infectoribus vel negligatur, vel reprobetur, quinto loco hic recensendam duxi. Diæteticam enim præparationem, corporis vires non labefactantem, ipsosque humores nec solventem, nec nimis commoventem, talem, quæ sine ullo vitæ consuetæ disturbio fieri potest, infitioni extemporaneæ præfero.

Omnia hæc jam memorata, in variolis naturalibus, communi modo per contagium acceptis, mere fortuita sunt,

Corripiuntur hoc morbo omnis generis, ætatis, sexus, vitæque conditionis, homines; infantes, pueri, juvenes, viri, ipsaque filicernia. Nec refert; sanus vel æger, robustus vel tener quis fuerit; siue sanos et laudabiles gerat in corpore succos, siue sanguinem alat acrem, corruptum, impurum; apti sunt omnes, nisi veris jam variolis laboraverint, ad suscipiendum contagium. Præterea sæpe ex ægro variolis malignis, vel alio morbo simul decumbente, acquiritur contagium, communicatur per contre-

ctati-

etationem, per circumfusam ægro atmosphæram squalidam, venenatam, quæ vel inspiratur, vel salivæ involuta deglutitur. Invadit denique sub quavis æris catastasi vel bona, vel mala, five siccus urat, five acerrimum gelu. Non potest ergo, quin a naturalibus variolis moriantur plures, quam ab insititiis; dummodo ipse insitionis actus a viris prudentibus, expertis, debita cum circumspeditione fiat. Dolent hoc, et acriter dolent Medici Galli *de Beaux*, *Vernage*, *de la Condamine*, pluresque

alii; quod non solum spurias cum veris confundant saepe operatores, sicque duplici periculo agros suos exponant; sed quod nimia quoque et culpanda maxime incuria et levitate artem inoculationem tractent, bonæque hujus operationis famæ sic detrahant.

Non diffitendum interim est, carere subinde optato successu, propter causas absconditas, institutam quamvis summam cum prudentia, inoculationem; immo symptomata interdum producere ipsis variolis naturalibus graviora. Notat sic

in

in epistola, quam ad cl. *Tralles*, *Ludwig* dedit, quod eodem tempore ex quatuor inoculatis amiserit unum, quum ex duodecim ægris, variolis naturalibus correptis, omnino mortuus fuerit nullus: licet inter hos fuerint, quos ob humorum malam constitutionem ab infectione arcuerit. Differt in vario corpore veneni variolosi actio; idemque pus, sub iisdem cautionibus, eodem tempore, diversis corporibus communicatum, raro eosdem producit effectus. Largitur idem hoc cl. *Gatti* in epistola sua ad Dn.

Roux: cui tamen in peculiari tractatu contradicit *Ierome Carné*. Pendet hoc partim a diversa succorum inquilinorum corporis insecti mixtione; partim a glandularum organorumque lymphæ secretoriorum ratione varia; partim ab aëris latente quadam non perferutabili semper acatastasia, huic operi inimica. Hæc ratio est; cur a pure ex variolis benignis desumto, subinde per insitionem variolæ nascantur pessimi moris teste *Gaubio*, cur generentur sæpe, quod cl. *Monro* et ill. *Gatti* videre obtigit, post superatum

ratum morbum, tumores glandularum
pertinaces, sæpe ulcera cacoëthea, diffi-
cillimæ sanationis, ophthalmiæ pessimæ,
erysipelata, aliaque mala, sæpe mortes.
Dubitatur V: *An simul cum pure vario-*
loso alius quoque morbus in corpus sanum
transferri possit? Resp. morbos exanthe-
maticos plures, per propriam, quam
in corporis superficie colligunt materi-
am, in alia corpora transferri posse,
quotidiana docet experientia. Quin ali-
os quoque gravissimos morbos, quot-
quot ex his ad contagiosorum classem
pertin-

pertinent, per humores infectos, ex corpore morbofo, in aliud fanum derivatos, facillime produci, toto die videmus. Hinc pus hominis variolofi, alia fimul labe laborantis, fi incuria operatoris ad infitionem adhibeatur, fimiles emnino in alio corpore morbos producere aptum eft. Metuendum autem hoc nunquam erit, fi de artis peritia et probitate *infitoris* confitet. Abfit quoque, ut cum D. *l' Epine* credamus, tantam forte aliquando fore hominum malignitatem, ut cum veneno varioloso aliud quoque

quoque toxicum misellis hominibus communicarent.

Interrogatur tandem: *Num post inventam et adhibitam insitionis artem, mortui sint in genere a variolis plures, vel pauciores, quam ante hanc periodum?* Resp. Disputatur et hæc quoque quæstio in utramque partem. Edimburgi, testibus necrologiis, tam ante quam post introductam a cl. *Maitland* a. 1726 inoculationem generaliter ex mortuis omnibus decimus semper a variolis moritur, in hunc usque diem. Londini docentibus

iisdem

iisdem tabulis mortuariis, ab anno 1725
quo tempore inferi coeperunt variolæ,
ad annum 1763 viginti duo mille et
septingenti homines, plus a variolis mor-
tui sunt, quam intra æquale tempus an-
te cognitam hanc inoculationis artem.
Refutavit exhibitum hunc a cl. *Rast*
calculus, multo opere, ill. eques *de*
Chastellux, legionis aquitanicæ præfectus,
celeberque *David*; qui ex iisdem his al-
bis contrarium probare contendunt.
Communicavit itidem citatus jam *Rast*
tabulas necrologicas Parisinas, quæ con-
tagium

tagium variolosum per insitionem immaniter auctum perhibent.

Alium omnino computum famosus insitoriae artis patronus *de la Condamine* sistit: fervari quippe solum in urbe Lutetia quotannis per insitionem variolarum probabiliter posse, demonstrat, homines mille quadringentos; per totum vero Galliae regnum 28000. Magnum profecto, si recte computaverit bonus vir, pro insitione argumentum! Sed errasse eundem, et graviter quidem in tractatulo non inconcinno, cui titulus, *Lettre*

tre

ere a M^{sr}. M. contre l' Inoculation, quⁱ combat le memoire historique de M^{sr}. de la Condamine, ostenditur fusius. Priori non impar omnino ductus est a cl. T^{is}oto calculus: scribit hic; quod si milio hominum inocularetur, servatum iri certo certius 132857 ex his, qui a variolis naturalibus probabiliter interiissent.

Positis ad N. IV. conditionibus, largior omnino, proventurum ex arte in-
fitoria in genus humanum notabile bonum. Neque tamen minus incrementa quoque contagii ex variolis artificialibus

nasci.

nascitura credo. Sunt in promptu exempla nati a variolis infititiis contagii. A variolis benignis artificialibus variolas malignas confluentes per contagium in sorore sua genitas descripsit constantinopolitanus medicus, *Timony*; pluresque alii similes narrant historias, quas hic nominatim citare superfluum foret, quum experimentis compertum habeamus, pus ex variolis artificialibus defuntum, ad ulteriorem infitionem omnino sufficere. Hinc, ut præveniatur præsens hoc ex inoculatione variolarum redundans in

D

rem-

republicam incommodum, jubent cl. *Vernage, Raft, Gatti*, ut segregentur sollicite ab hominum consortio inoculati, sicque verenda ceteroquin, ex his nascitura morbi variolosi propagatio caveatur. Remedia illa, quæ ad pestis contagium limitandum conveniunt, in hoc casu adhibere suadet *Krause*. Nosocomia pro infitione ad distantiam trium leucarum extra urbes construenda, ipsosque a morbo hoc convalescentes, et in urbem reduces, per quadraginta integros dies ab omni hominum commer-

cio

io arcendos, militumque excubias in hunc finem adhibendas vult *le Hoc*. Et sic quisque, pro ingenii sui fertilitate, pia dedit, pro bono publico, nunquam forte exsequenda consilia. Probe penfitatis omnibus his difficultatibus, fatius non nullis visum est, si possibile foret, extirpare funditus hunc morbum, ejusque venenum corpori actu ingestum, ante sui evolutionem, destruere penitus. In antimonio et mercurio vivo, certa encheiresi intime inter se unitis, verum variolarum antidotum aliquando inveniri

credidit *Boerhaave*. In junipero latere aliquid specifici antivariolosi putat *Monro*. Pilulas ex calomelite, camphora, extracto aloes et gummi guajaci ad hunc scopum apprime laudat *Rosenstein*. Ut febrem inflammatoriam morbum hunc variolosum absque pustularum suppuratione tractare, nec inepte, docet *Medicus*. Proposuit quoque extirpationem sub *Krausio*, *Beer*, qui autem præter remedia ad contagii cujusvis arcendam propagationem usualia, novi nihil profert.

En AMICE! methodum meam, qua

eodem

eodem hoc scopo non sine successu usus fui. Casum ipsum breviter enarrabo, medendique rationem. Quæ, quousque proposito fini satisfecerit, judicabis IPSE.

Præterlapso anno, mense Julio ad virginem vocabar adultam, vegetam, plethoricam, non invenustam. Hæc ab itinere redux, quod ad pagum quendam vicinum tribus forte leucis ab urbe distitum, visitandi cognatos causa, susceperat; per unum alterumve diem de insolita corporis lassitudine, appetitu læso, somnoque inquieto quæsta, post vali-

diorem factam corporis commotionem, capitis doloribus vehementibus, lumbagine, nausea, conatibus ad vomitum febreque simul satis valida prehendebatur; quibus omnibus, pulvere temperante nitroso, largaque venæsectione eadem hac die celebrata obviam ibatur. Die sequenti facies, totumque caput cum collo et brachiis ita tumebant, ut prorsus dissimilis sibi ipsi facta fuerit ægra. Variolis se nondum laborasse jam narrabat, et vereri se, ne ipso hoc morbo sit affecta, quum per totum istum vicum,

cum, in quo per aliquot dies esset com-
morata, grassatæ sint ubique variolæ.
Vero non dissimilis videbatur hæc vir-
ginis suspicio, ipsaque memorata jam
morbi symptomata eam augebant. Nec
celavi ægræ meam de morbo sententi-
am; animum tamen sollicitæ addidi,
simulque quid ars ad proculcandum in
herba malum valeat, me tentaturum
promisi. Molliuscula fronti et tenera cu-
tis erat; rosæ insuper facileque erube-
scentes genæ. Hinc faciem præ aliis
larga exanthematum segete notandam

verebar. Dilutus præterea mobiliorque sanguis, ab imminente brevi febre acutiore, inflammatoria, citam degeneratorem in putridam solutionem, nasciturasque exinde variolas malignas confluentes minabatur. Omnibus his natura accedebat valde actiuosa, præceps animus, et dispositio biliosa; ad latam in substrato casu formandam prognosin non omnino idonea. Quæ adhuc subinde redibat nausea, hæere adhuc aliquam miasmatis partem in primis viis, communi hoc materiæ cuiusvis exanthematicæ

ica diverforio, notabat: aliam autem, jam sanguini admixtam, veneni variolosi partem, quæ febrem accenderat, revocabilem adhuc, saltem pro maxima sui parte, ad primas suas sedes, canalem intestinorum, sperabam. Hinc, ut primo materiam variolosam a facie avocarem, simulque huic ad exitum viam sternerem expeditam, vesicatoria bina grandiuscula, acuata, magnitudinis duorum pollicum rhenolandicorum in diametro, utræque suræ apposui. Dein ut solutioni sanguinis putridæ quantocyus

occurrerem, fincerum corticis peruviani decoctum, cui camphora, nitrum, spiritusque vitrioli, nec non syrupus aliquis pro gustu meliori accefferat, largiter hauriendum præcepi; quum interim ad fallendam sitim, quæ validissime urgere incipiebat, solum tamarindorum decoctum concederem. Mastrucæ tandem imponere agram, fragula quam levissima esse, pavementum aceto madere aërique in cubiculo pertransitum liberum fieri suasi. Quæ sequebatur nox turbulenta erat et insomnis. Forte et animi-

folli-

sollicitudo metusque de morbi exitu formidinum arcuerat.

Tertia dies tumorem insigniter auxerat, simulque in genis a latere colli, et in pectore prodierant maculæ latæ rubellæ, sensim sese elevantes, pustulasque minimas numerosissimas protrudentes. Hinc, quum camphoram veneni variolosi speciale antidotum scirem, dosim ejus in decocto corticis auxi, utque ex aqua frigida camphorata totam faciem partesque superiores spongia madefacta subinde lavet, linteaque aceto camphorato

rato madida manibus detineret auctor fui. Interim potus ille ex tamarindis continuo haustus, alvum creaverat laxam, materiamque exturbabat foetidissimam, copiosam. Applicata vesicatoria bullas elevaverant amplissimas, crassas, fero acerrimo, caustico plenas, totamque viciniam tumore et rubore inflammatorio, multum dolente, notaverant. Ut ergo deglubata hæc loca suppurare eo melius facerem; quantumque liceret, materiæ morbosæ huc allicerem, unguento digestivo non nihil irritante illa deligavi,

; cete.

ceterum in instituta methodo nihil omnino mutans. Facies hodie ab elevato tumore admodum tensa graviter doluit.

Sequenti die, quam nox non omnino infomnis præcefferat, elevari hic illicve magis pustulas, maximam tamen earundem partem omnino evanidas, non sine gaudio vidi; præprimis, cum minui magis, quam augeri viderentur symptomata. Urina hodie missa, post aliqualem quietem turbata, leve demisit sedimentum. Quæ in furis paraveram artificiosa ulcera totum, quem circum-

jece-

jeceram, apparatus materia purulenta
conspurcaverant, pustulæque aliquot
elevatiores arrosa a cantharidibus loca
circumcinxerant; dum eodem hoc tem-
pore sparsa per superiores partes exan-
themata variolosa magis magisque eva-
nescerent. Oculos hodie inflammatos
et maximopere dolentes collyrium texit
refrigerans. Rebus sic dispositis, alvum
tamarindorum decocto non nihilatura-
tiori, magis adhuc laxam reddidi, et
corticis peruviani decoctum meracum,
nitro, camphora, et spiritu vitrioli gra-
vidum

vidum, qualibet hora ad unciam unam exhibere perrexi. Quo factum, ut quinta, a qua vocatus fueram, die faciem totam, omnesque superiores corporis partes, liberas a pustulis viderem ruboremque et dolorem oculorum insigniter imminutum. Febris minor fuit, et laxior alvus. Ulcera crurum non solum ingentem puris copiam per applicata lintamina diffuderant, sed pustulæ quoque vicinæ, non omnino viginti, veram jam materiâ purulentam colligere incipiebant. Sexta morbi die, naturali vix citatior obser-

observabatur pulsus, animique serenitas post placidissimum somnum redierat. Augebantur dispersæ per pedes pustulæ, veroque jam, cocto et flavescente pure implebantur, florebant omnes late, singulæque Zonam circumfusam habebant coccineam. Valuit præterea ex voto agra, si dolores exceperis pedum tensivos, admodum molestos. Alvus solutior manfit. Urina sub vespertinam missa, sedimentum deposuit crassum, copiosum, purulentum; largam quoque materiæ purulentæ copiam dederunt factitia in cruribus ulcera.

Mole-

Molestior septima dies fuit, ob capitis dolores hebetes, post insomnem, propter accusatos jam pedum dolores pervigilatam noctem, natos. Maturescebant magis magisque variolæ; fundebant insignem puris copiam vesicatoriis notata loca; reddidit satis magnam ejusdem materię quantitatem lotium; perexitque in evacuationibus suis citatior alvus. Continuato sic remediorum evacuantium, corticisque peruviani et camphoræ usu, alitaque continuo ulcerum artificialium suppuratione larga, totum hunc mor-

E

bum

hum divinis sub auspiciis profligavi feliciter, curamque ipsam tandem infuso chinae et rhabarbari vinoso finivi absque quod vel minima restitantis adhuc variolosi femini suspicio superfuerit.

Defuit huc usque, quum quinto solum quovis recurrente anno a variolis epidemicis in urbe patria visitemur, repetendae hujus methodi occasio. Meretur tamen, quae repetatur.

Restat unum, quod ad facilitandam et perficiendam hanc variolis naturalibus medendi methodum eximii profecto usus

erit;

erit; quod copiam variolarum manifeste
minuet; quod cicatrices, aliasque fœdas
cutis deformitates a variolis interdum
nasci solitas præveniet; quod totum et bre-
viorem et leviozem morbum faciet; quod
tandem pleniorẽ spondebit sanationem
omniaque illa arcebit secundaria mala,
quæ post superatum variolosum morbum
subinde restitare in corpore observan-
tur. Est hoc incisio variolarum simulac-
rocto pure implentur, toties repetita quo-
ties nova ibi regenerata materia fuerit
et sollicita puris deterfio. Apertas sic

variolas ter quaterque videmus simili materia purulenta redimpleri: ergo unica talis incisa sæpius pustula tantum materiæ morbosæ evacuabit, quantum tres vel quatuor non incisæ variolæ dedissent. Hinc, si ponamus; collectam in corpore fuisse talem materiæ variolosæ copiam, ad quam eliminandam centum forte pustulæ fuissent requisitæ; eidem huic operi jam viginti quinque sufficient, multoque minori cum incommodo æqualem materiæ morbosæ copiam educent, quam centum illæ præstitissent, si omnes

mines bonum et laudabile pus collegerint. Fieri cicatrices constat, si hærens nimis diu in variolis pus, acre redditum, subjectas partes arrodât. Evacuata ergo tempestive hac materia, hæ quoque cavebuntur.

Scimus præter hæc, affricatum cuti externæ simpliciter et a venis bibulis resorptum variolosum pus, totam humorum massam corrumpere morbumque hunc regulariter producere: quanta ergo mala creabit in corpore jam actu morbofo, febre putrida laborante, succisque

infectis undique scatente hoc fermentum si vel ex disruptis casu variolis maturis, et cuti sic applicato pure, nova de novo morbi materia sanguini fuerit suppeditata; vel si a quacunque causa ex variolis ipsis jam pure cocto turgentibus relabatur in massam humorum collecta jam et ad corporis superficiem determinata variolosa hæc materia? Nota nimis pessima hæc symptomata sunt; quam quæ hic recenseantur.

Quumque tandem mediante hac operatione major semper materiae morbosæ
quan-

quantitas ex corpore educatur, ipsaque hæc evacuatio plenior fiat, necessario quoque sanationem plenioram futuram, omniaque, quæ a relictâ forte in corpore materia variolosa produci solent, mala secundaria facescere debere, sequitur.

En jam, VIR CLARISSIME! methodum quandam, variolas naturales, quoad benignitatem, artificialibus æquales reddendi, et præstaturam fortassis plus, si excolatur magis, et perficiatur. Gratulor interim TIBI de fausto infitionis a TE factæ successu; sine quo certo certius

eadem Vesaliæ incurriffes a vetularum
tribu pericula, quæ Brixenæ *Octavius*
Marocchi; forte majora. Tantum de va-
riolis. Transeo jam ad illam proprie
Tractatus TVI partem, quæ anfam mi-
hi scribendi dedit. Notasti breviter,
ictericos factos Vesaliæ esse infantes quos-
dam tussientes; simulque historiam mor-
bi icterici periodici addidisti, quem so-
lus antifebrilium medicamentorum usus
cūnavit. Accidit jam casu, ut eodem
forte tempore, quo observationes TUAS
Vesaliæ collegeras, et hic quoque apud

nos

nos similis plane morbus, tam in urbe ipsa, quam in pagis vicinis per infantes grassaretur, mihiq̃ue ante detectam morbi causam quoad medicationis modum multum operis faceretur. Rei pretium ergo me laturum credidi, si regii hujus morbi, ejusque symptomatum rationem paucis expendam; quam circa hujus morbi causas et genesin mihi formaveram ideam tribus TEcum communicem, simulque methodum indicem simplicissimam, cujus ope rariorem hanc Morbonæ sobolem debellaverim feliciter.

Addidi Tractationi huic, icteri non minus notabilis periodici historiam; dignissimam hercle, quæ propter miram symptomatum complicationem, abstrusumque morbi genium oblivioni furripatur; præsertim cum tanta fuerit atrocissimi hujus morbi pertinacia, ut per triennium integrum, omnem, et selectissimorum quoque remediorum eluserit efficaciam, tandemque mutata scena, mortem ægro intulerit.

Dulce est, fateor, feliciter gestarum rerum tradere historias, adhibitorumque
reme-

remediorum præsertim novorum celebra-
re per orbem effectus; nec inficias ibo,
insigne ex sanatorum morborum atro-
cium historiis, fideliter et sine fastu con-
scriptis, redundare in artem nostram
emolumentum. Verum enim vero, non
minus nostra interest, infelicium quo-
que et carentium optato successu medi-
cationum, scire historias, scire applica-
torum remediorum apparatus, seriem,
effectum, scire symptomatum sibi succe-
dentium totam syndromen, eorumque
ad ultimam usque scenam metaschema-
tismum;

tismum; videre tandem morientem ipsum agrotum; immo (si licet) in jam mortuo, absconditam rimari morbi fedem.

Data sic fideliter morborum singulorum atrocium diaria grandes ferunt artis salutaris cultoribus fructus. Non deprimunt solum celsum nimis sciolorum supercilium; sed ingenuis quoque medicis exemplo esse possunt, secundum quod prognostica suam in simili casu formare, consilia sua dirigere, notatasque syrtes evitare tuto possint.

Fecerunt hoc principes jam priscorum

seculi

ſæculorum artis noſtræ fundatores. Notavit infanabilium ſibi morborum exempla fideliter *Hippocrates*, quin ipſa a ſe perperam et præcipitanter adminiſtrata medicamenta infauſtumque eorundem effectum non reticuit, futuri ut ævi medicos a methodo tali funeſta deterreret, faceretque per aliena pericula cautiores. Hæc ſenis noſtri veſtigia premens, celeberrimus quoque *G. Young*, in tractatu ſuo, Anglico ſermone, *de Opio* ſcripto, omnes quoque recenset infelices illos caſus, in quibus vel nullum omnino, vel ma-

lum

lum effectum produxerat exhibitum a se
opium. Neque minori ingenuitate cl.
Hanius usus est, in describendo lethali,
a tentata cranii unctione, eventu. Dedit
itidem morborum sibi et arti invictorum
historias alter medicinæ parens ejusque
restaurator *Boerhaavius*, non quidem eo
fine, quo *Cous*, sed ut pateret manifesto,
quæ morbi illius singularis fuerit crude-
litas, quæ symptomatum ratio, quale ex
his ferendum prognosticon, et quæ re-
mediorum frustra adhibitorum insupe-
rabilis causa. Alia sæpe accedit, medi-
cum

cum ingenuum ad edendas publice mor-
 borum hujusmodi fatalium historias de-
 terminans ratio: hæc nempe, ut tolla-
 tur detrahendi occasio malignis sæpe ni-
 mium et acclinibus falso alienorum ca-
 suum commentatoribus.

Gaudebo, si paucula hæc in artis incre-
 mentum aliquid conferre posse, cense-
 bunt æqui rerum arbitri. Gaudebo si et Tu
 subcesivas nostras curas, quarum materiam
 suppeditasti JPSE, in amicitia nunquam in-
 terruptæ signum accipere dignaberis. Va-
 le! Dabam Effendia, idibus Martii 1773.

TRACTATUS

DE

JCTERO SPASMODICO

JNFANTUM

ANNI 1772.



DE
ICTERO SPASMODICO

Actum quidem agere, et Iliada post
Homerum scribere videbor, de *Ictero*
jam dissertaturus; dum Medicorum pri-
mos, *Boerhaavium* ejusque non minus
celebrem discipulum, rivalem, et com-
mentatorem L. B. *Swietenium*, pluresque
alios non minorum nominum nostri
ævi viros, in exoranda hac sparta ha-
buerim antecessores. Qui quicquid ex
locupletissimo priscorum Medicorum pe-
nu,



nu, ex multiplici et annosa experientia, fuloque his casto ratiocinio, ad determinandas multifarias hujus morbi et abstrusas sæpe matrices, ad eruendum verisipellem ejus genium, ad superstruendam omnibus his medendi methodum, pro causarum differentia longe diversissimam, scitu posteris necessarium putarent, improbo longoque labore congesterint, themaque hoc exhauferint penitus.

Meruerunt omnino Viri hi universales vastissima sua eruditione, rerumque peritia, utilissimisque suis, quibus fore-



riam artem locupletarunt, inventis, non monumenta solum honorifica publica, sed perenniores omni ære et marmore laudes, gratiasque immortales, ob singularem et inimitabilem sane in perscrutandis, describendis, renuntiandis, curandisque morbis, acribeiam. Supererant tamen adhuc bene multa, quorum cognitio intimior servata nostro sæculo fuerat; supererunt longe plurima, quorum inventio feros demum nepotes manebit. Erunt quæ eruentur nunquam.

Multum profecto medicinæ hodiernæ

practi-



practicæ lucis affuderunt epidemici, quibus jam ab aliquot retro annis premimur, et maligni morbi. Omnem hi medicantium attentionem, industriam, assiduitatem, omneque ingenii acumen provocarunt, ad detegendas flagellorum hujusmodi publicorum absconditas causas, eorumque genium plane singularem; ad explicandam complicatissimorum inter se symptomatum ex causa detectionem, ferendaque ex collatis his firma et stabilia prognostica.

Nec defuere, qui suo ipsorum vitæ



periculo, diu noctuque circa ægrotorum lectulos assidue versantes, et ad minutissima quævis attenti tandem ad perno- scendam veram substrati morbi indolem, dignoscendasque varias, in quas induere se solent, formas, herculeo labore pervenerint, dulcissimosque inde pro salute publica tulerint et nunquam inter- morituros fructus. Illustris hæc semita est, in qua Sydenhamus, Pringle, Hux- ham, Forbergil, Monro, Baldinger, Hirschel, Strack, Tissot, Zimmermann, Al- lion, Benvenuto, Sarcone, Torti, aliique
plures



plures, tantam sibi conquifiverunt gloriam, laureasque reportarunt, post facula non emarcituras.

Id præterea utilitatis arti medicæ sæpe præbent morbi epidemici, ut ad perveftigandam et illuſtrandam illorum quoque morborum naturam, cum quibus vel conjunguntur, vel ex quibus emergunt, vel in quos tranſeunt, multum ſubinde conferant; novosque ſic cauſarum fontes aperiendo, amplum ſimul adhibendorum cum fructu remediorum, antea vel igneratorum, vel ſaltem neglecto-



rum monstrent campum. Quid, quod, quum epidemiarum tempore plures simul, variæ ætatis, constitutionis, temperamenti, vitæque ante actæ homines, ex eodem morbo decumbant; medico quoque observatori sufficiens inde suboritur occasio in abstrusissimas morbi sedes inquirendi, et ex collatis inter se tot agrotantium symptomatibus, aliquid certi definiendi.

Idem omnino circa præsentem, cujus historiam jam molior, morbum, obtinuit. Jcterus erat singularis, intermit-



rens, periodicus, tenella, irritabiliaque
præ aliis corpora maxime invadens, om-
nibus, quæ alias huic morbo opponi so-
lebant remediis, solventibus, aperien-
tibus, evacuantibus, non solum non ce-
dens; sed ab adhibitis his, licet lenissi-
mis, manifeste auctus; cujus tamen
naturam et causas solas hic status
epidemicus, prægressusque mor-
bus tandem prodidit; postquam
et medicantium et ægroto-
rum patientiam diu fatis
tentasset.



HISTORIA MORBI.

Post febres mali moris biliosas, liquida corporis humani fatis cito in putredinem solventes, æstivo tempore furentes, adventante autumnino tussis quædam stomachalis, ex convulsivarum classe, quam pro catharrali, ab ingruentibus jam variis atmosfæræ mutationibus, vulgus habebat; quamque post febres biliosas prægressas, non infrequentem *Huxhamius* (a) notat, infantes maxime

adorie-

(a) Observaciones de aëre et morbis epidemicis ab Anno 1728 ad 1737 Plymouthi factæ.



adoriebatur; cui post unum alterumve
paroxysmum, subinde tardius, dolores
fese jungebant infimi ventris atroces,
colici, cum totius corporis rigore. Hi
sensim ab inferioribus adscendentes in
cardialgiam desinebant vehementissimam,
ad mentis alienationes, artuumque spa-
smodicos motus non raro pertingentem.
Brevi post pectoris constrictione asthmati-
ca, respirationis difficultas et ominosa
præcordiorum anxietas succedebant, cum
pulsu parvo, contracto, tardo, et in-
termittente. Omnibus his, nisi secnam
prius



prius clauderet subitanea mors, socium sese præstabat *Icterus*, oculi albugineam, omnemque cutim foeda aurigine tingens; deoppilantibus quibuscunque, bilemque spissiore fundentibus remediis, appropriatissimis, inobedientissimus; a purgantibus, vomitoriis, aliisque in tussi stomachali efficacibus alioquin et activis remediis, insigniter auctus, post solutum paroxysmum in principio brevi cessans, dein diutius superstes, tandem pertinacissimus. Quibusdam dysuria accedebat; stranguria aliis, perquam molesta; prodi-



prodiensque guttatim lotium tenue, decolor et aquosum erat. Fæces alvinæ, siccæ, gryseæ, in scybala rotunda, parva, caprina, formatæ, excernebantur. Sudor profusus, alvique et urinæ profluvium largum, quemlibet paroxysmum, semel, bis vel ter in die invadentem, solvebat. Ingens hoc tempore pusionum grex libitinæ cessit; præsertim e gente rustica, quæ non nisi conclamatis jam ægri rebus, auxilia adhibere solet; morte medicationen præveniente.

Sæculum effluxit, quum hujus generis

(*Icte.*



Icterus Angliam quoque infestaret, aperte spasmodicus, post colicam biliosam spuriam, subjecta mollia, debilia, irritabilia, infantilia, foeminina hysterica et masculina hypochondriaca, præ aliis invadens; similiter periodicus, ab omnibus aperientibus evacuantibus, ipsa venæsectione, quin ab enematibus, vel blandissimis graviter exasperatus, per emollientia sola, uti et *Essendiensis* noster, tractandus. Descripsit epidemiam hanc annorum 1670, 1671 & 1672 fulgentissimum Britanniae lumen et Londinen-



dinensium decus, inter observatores practicos ex accuratissimis, *Sydenhamus* Sect. IV. Cap. VII. p. 213. Huic in sequentibus historiam febrium continuarum epidemicarum a. 1674 & 1675 favientium subjungit; quas, deposita ad intestinallem tubum materia morbose, superveniens diarrhoea critice judicabat; quibus autem, si aëri externo frigidiori sese nimis exponerent ægri, *icterus* ordinarie accedebat.

Necque singulares vel rari casus illi sunt, ubi morbis epidemicis focius adest

icterus.



icterus. Plura apud observatores prostant hujus rei exempla. Celebriora hic nominabo. In febre illa epidemica, quæ Gandavum anno 1742 vastabat, post ventriculi et abdominis dolores acutissimos, biliosamque diarrhoeam, icterum ubique præsentem notavit cl. *Home* (b) Jeteri cum morbis epidemicis Moguntinis annorum 1754 & 1755 conjuncti historiam nobis dedit cl. *Strack* (c) Morbo illo epidemico mucoso, anno 1761
men-

(b) Medical Facts and experiments by Francis Home Edimb. 1760.

(c) Acta Academ. Mogunt. Scient. util. Tom. I. pag. 320.



mens. Mart, quem cl. *Ræderer* cum *Waglero* describunt, icterus non minus solennis fuit, quam epidemiæ illæ Göttingensi, quam cl. *Riepenhausen* exhibuit, ubi, post febres petechiales emergens, in febrem intermittentem malignam transiit. In morbis biliosis, castrensibus, remittentibus, post atroces ventriculi dolores, nauseas, regium eundem hunc ex spasmodicorum genere morbum familiarem notat cl. *Pringle* (d). Tertianæ duplicæ epidemiæ, cum vomitu perpetuo, do-

G

lori-

(d) Beobachtungen über die Krankheiten einer Armee Th. 3 Cap. 4.



loribus colicis, copiosisque dejectionibus biliosis junctæ, adsociatum icterum fuisse memorat cl. *Mœring* (e). Arquatam hunc morbum, dysentericæ putridæ, copiosis, quæ anno 1766 Lusitaniæ dabantur, auxiliatricibus, epidemicæ, ubivis supervenientem, descripsit cl. *Christ, Douglasf.* Similiter et icterum febribus illis epidemicis malignis, quæ Vratislavian sub finem elapsi sæculi depopulabantur, socium ubique observavit cl.

Helwich

(e) *Commerc. Norimberg.* Anno 1736 Hebd. III, art 2, it. Anno 1737 Hebd. 22,

Helwich (f). Ut jam de alijs in præsentia taceam. Maxime tamen notandum, omnia, quotquot a Medicis secta sunt defunctorum ex morbis his ictericis cadavera, nullum unquam exhibuisse vel hepatis vel cystidis felleæ aut ductuum biliariorum visibile vitium. Hinc solam cystidis ejusque excretorii ductus stricturam spasmodico convulsivam, effluxum bilis in duodenum præpedientem, icteros hos unice produxisse manifesto constat. Obtinuit idem in nostra epidemia. Percurre,

G 2

re,

(f) Historia morborum, qui annis 1699, 1700, 1701 & 1702 Vratislaviæ grassati sunt p. 14.



re, si libet, multiplices ictero generant-
do ministrantes causas morbosas, earum-
que symptomata; confer hæc ad morbum
nostrum singula. Nullam profecto ex o-
mnibus his ad præsentem casum referri
posse, videbis. Iustrabimus præcipuas.

Cholopoieseos instrumentum princeps
hepar est; hoc ergo præter naturam mor-
bose affecto, universum quoque secreto-
rium bilis opus impediri, turbari, et
interrumpi necessum est. Restitabunt
ergo, quæ segregari a sanguine secundum
naturam debuissent, elementa oleosa, sa-
lina,



lina, quæ prima constituunt fellis utriusque stamina, recedet a sana sua crassi et solvetur hoc sapone sanguis, nascetur cacochymia biliosa, fiet icterus. Quem pressio pede generalis humorum putrefactio sequetur.

Plura sunt hepatis vitia, ictero producendo apta. Inflammatio huius visceris vera morbus quidem rarius est, quam vulgo creditur; veram ergo hepatis phlegmonem, si non ad non entia, saltem ad rarissime contingentia refert *Frid.*

Hoffmanus (g) Hæc autem inflamma-
G 3 tio
(g) Oper. pathol. pract. Dec. I. Diff. 8.



tio si magna et profunda fuerit, ipsumque hepatis parenchyma occupaverit, icterum generat. Levis, in extima quadam hepatis parte enata, vel superficialis solum inflammatio, quam erysipelatosam vocant, ad biliaria vasa non pertingens, icterum nunquam producit per se, quantacunque etiam in corpore cicat symptomata. Sed si ad causas et symptomata attendamus, hepatitidem veram et antecedentia, quam comitantia, quæ et, *Boerhaavius* enumerat (h), nullum ex his in ictero nostro obtinuit.

Scirr.

(h) Aphorism. §. 916. sequ.



Scirrhosum sæpe fit hepar et in lapideam fere indurefcit foliditatem, fic, ut non officio cholopoiefeos folum defungiesfet vitiatum in fabrica fua organica hoc viscus, fed ut mole quoque enorme partes fibi appofitas comprimat, vafaque fic biliaria arctando auriginem producat. Varia vitiiati hoc modo hepatis exempla *Bonetus* notavit in *Anatomiaæ practicaæ* tomo fecundo, libro tertio, fect. 16. obf. 3 et 4. Nec non *Vesalius* in data ad *Ioachimum Roelants* epiftola, quæ in *Operum* tomo fecundo



pag. 674 habetur (i)

Frequens non minus est hepatis abscessus, morbus in suis principiis saepe difficilis cognitionis, totum nonnunquam hoc viscus adeo despascens, ut non nisi saccus coriaceus, pus teterrimum continens, a tota ejus substantia superfit. Vidi ipse plura hujusmodi in sectis cadaveribus exempla, aliaque notarunt præter Bonetum jam citatum, cl. Bianchi, Fo-

restus

(i) Conferri huc poterit cl. *Van Swieten* Comm. ad Aph. Boerhaavii Tom. 3. §. 946; pertinetque huc *Hippacrazis* aph. 42, sect. 6. aph. 64. sect. 4. it. coac. prænot. art. 122.



vestus, *Bartholinus*, *Coiterus*, pluresque alii. Regium vero morbum ex destructo sic in universum viscere hoc principe cholopoietico nasci, et quidem pessimi moris, nullius, credo, indiget probationis. Periodicum ex tali hepatis labe icterum productum recensuit in Actis Edimburgensibus *James Dundas* (k)

Tolluntur aliquando in ingentes varices vasa hepatis sanguifera, venosa, *Morrone*, *Bianchi*, *Vesalio*, *Boneto*, ali-

G 5 isque

(k) Tom. 2. art. 29. Referendus huc erit Hippocratis aph. 45. sect. 7. ut et coac. prænот. art. 451.



isque testibus. Hi pariter organa bilis
secretoria sibi vicina comprimendo, eor
rumque functionem impediendo, mor
bum regium efficiunt. Idem fieri potest
per infarctus, (quos ab atonia hepatis ejus
que debilitate morboſa maxime naſci
contendit *Fr. Hoffmannus*) (1) ſystema
tis vaſorum hepaticorum a materia gy
pſea (m) ſteatomatoſa (n) et calculoſa
factos. Notandum tamen, corpora hæc
pere-

(1) *Med. rat. ſystem.* Tom. III. ſect. 1.
cap. 4. §. 39.

(m) vid. *Acta. N. C.* Tom. 2. obſ. 176

(n) *Gliffonii Anat. hepat.* cap. 8. it.
Columbus lib. 15.



peregrina, quorum in ipso hepatis parenchymate præsentiam oculati testes probant *Camenicenus* in epistola ad *Matthiolum*, *Dodonæus* et alii, icterum tum demum producere, si in pororum biliarum vicinia confederint, eosque vel mole vel pondere suo compresserint. Hujusmodi casus legi possunt apud *Columbum*, *Glissonium*, *Fallopium*, *ab Heer*, *Reverborstium*, *Riedlinum*, *Peucerum*, aliosque plures,

Alius ex his infaretibus sequitur ictero insanabili producendo commodus hepatis



patis morbus. Obstructis nempe a materia qualicunque oppilante vasculis biliaris secretoriis, dilatabuntur (quod ubique fieri solet) præter naturam vicini venæ portarum rami liberi, promptissime ergo effluet delatus ad hoc viscus sanguis. Collabentur infarcta non solum, sed alia quoque lateralìa hepatis minima vasa. Concreſcent priora cum materia, quam sinu ſovent, obſtruente; alia per applicatas ad ſe invicem parietes. Minuitur ergo mole hepar, fit aridum, exſuccum, inſtarque corii durum. De-

structa



structa ergo machina, filebit bilificatio, restabit in massa humorum ex his sequestrandum fel, nascetur icterus pessimus. Vidit hanc arguati morbi causam in secto cadavere *Swietenius*. Productum a simili hepatis deturpatione solenni icterum memorat in Historia Academiae Regiae scientiarum *Du Verney junior*, parilemque casum describit in observationibus suis *Tulpinus*.

Gliscunt nonnunquam per choledochum ductum vermes ipsamque hepatis substantiam intrant. Celebrem historiam vermis,



vermis, hepar sic ingressi, illud depa-
 scentis et dein per eandem viam rursus
 egressi, atrocissimorum symptomatum
 ipsiusque mortis causæ cl. *Bond* tradit
 (o). Alia insuper hepatis parenchyma
 inhabitantium vermium exempla memo-
 riæ prodiderunt *Bianchi*, *Ruyseb*, *Bid-*
loo, reperitque lumbricum, qui peresa
 hepatis substantia, capite suo, usque
 ad vestientem externam huius visceris,
 in gibba ejus parte, membranam pene-
 traverat *Galenus Wierus*. Publicavit ob-
 serva-

(o) Medical Observations and Inquiri-
 es vol. 1, art. 9. p. 68.

servationem hanc *Iohannes Wierus*, *Galenus* pater (p); legique circa hæc apprimè meretur cl. *Pallas* Differt. de infestis viventibus intra viventia, nec non cl. *van Doeveren* Diff. inaug. de vermibus intestinalibus hominum.

Contingit quandoque ut materia quædam purulenta, ichorosa, apostematica per metastasin ad hepar deferatur, ibique pro sua indole diversa producat et fontica sæpe mala, inter quæ non raro icterus. Exemplum vidi ipse. Obtinere autem

(p) vid. oper. omn. p. 316. §. 5.



autem ex recensitis his icteri causis in nostro morbo omnino nullam, cuilibet me non monente patebit.

Pergimus ad cystidem felleam. Varias et hæc quoque, si quoad organicam suam structuram a statu naturali sano recesserit, morbi arcuati causas largiri potest, dum vel inflammatur (q) vel abscedit (r) vel extenditur ultra tonum.

Fieri hoc observata docent numerosa laudati

(q) *Sabazier* Dissert. de calculis felleis Montpelii habitæ 1758. p. 74. cl. Auctor morbum hunc *cystidem* vocat.

(r) *Pommé fils*, vid. Journal de Médecine Tom. 10. p. 432. item *Guettard* Histoire de l' Acad. Royale des sciences a. 1739.



dati jam *Sabatieri*, celebrisque *Gibsoni*,
qui receptaculi biliosi hydropem in A-
ctis Edimburgensibus describit (s). *Vesalius*
in Martello cystidem felleam duo-
rum pugnorum magnitudinis invenit.
Naturali sextuplo maiorem illam vidit
Zwingerus; magnusque *Swietenius* in
Commentariis ad aphorismos *Boerhavi*
§ 935 foeminæ ictericæ exemplum pro-
fert, in qua cystidis felleæ fundus ad os
iliusque pertingebat. Similem præter-
ea extensæ in ingentem molem vesicæ

H

bili.

(s) Tom. 2. art. 30.



biliaria ab humore pituitoso casum narrat *Du Verney*, Hist. de l' Acad. Royale des Sciences anno 1701. Impeditur non solum a præternaturali hac cystidis extensione liber bilis ab hepate in cystidem transitus, sed idem in vesica quoque fellea obtinet, quod in vesica urinaria fieri solenne est; claudi nempe vesicæ collum tanto arctius, quanto magis extenditur vesica. Quid, quod ipsum tale vas membranaceum, ultra tonum distentum, contractilem suam amittat cum ela-

tere

tere vim (t) nesciumque arctari tandem
ab affluente continuo liquido necessario
rumpetur, suaque contenta effundet in
cavum vicinum cum eventu lethali. De-
generem in cartilagineam, immo osscam
substantiam, cystidem, icteri lethalis cau-
sam *Rhodius* vidit (u). A callositate vesi-
culæ felleæ, quæ ex observationibus cl.
Morgagni, *Boneti*, *Wepferi*, aliorumque
ut plurimum ab attritu illo oritur, quem
contenti in cavo cystidis calculi produ-
cunt,

H 2
(t) vid. *Halleri* instit. physiolog. Tom.
6. tit. Hepar. it. *Morgagni* Epist. anat.
med. 37. art. 14. nec non *Galen*i de
loc. affect. lib. 5. cap. 7.

(u) Cent. 3. obs. 96. et cent. 11. obs. 3.



cunt, ictericiam in matrona nobili Pætavina natam memorat cl. *Morgagni* (v).
 Excrescentias peregrinas fungosas in his locis, icteri insanabilis fonticas causas, in sectis cadaveribus detexit citatus idem *Morgagni* et præter hunc *Donatus*, *Nicolas*, (w) aliique.

Calculos in cystide fellea nasci res rara non est. Adeant, qui horum exempla legere cupiunt, observatores ipsos.

Ruy-

(v) De causis et sedibus morborum lib. 3. Epist. 30. art. 7. et Epist. 36. art. 2. Alia exempla prostant in A. N. C. Tom. 4. obs. 140. et in *Bezoldi* Diss. de cholelitho. Argentor. 1725.

(w) Sect. 5. cap. 2. art. 3.

Ruyschium (x) *Störkium* (y) *Hoffmannum* (z) *Henry* (a) *Storchium* (b)

Mentzelium (c) *de Blegni* (d) *Barto-*

letum (e) alios. Quin ipsis vesicæ bili-

ariæ tunicis internidulatos hos referunt

Ellerus, *Morgagni*, *Galeatius*, *Calculi*

H 3 autem

(x) Obs. anat. 24. p. 25.†

(y) Ann. medic. 1. pag. 126

(z) Med. rat. system. Tom. 4. sect. 2.
cap. 3. obs. 1.

(a) Recueil periodique d' observations
de Medecine par Msr. *van der Mon-*
de Tom. 7. m. Nov.

(b) Commenc. lit. Norimb. ann. 1735
hebd. 50. n. 4.

(c) Ephem. Nat. Curios. Dec. 1. Ann.
9. obs. 181.

(d) Zodiac. Med. Gall. Ann. 1. Epist.
4. obs. 7. Epist. 5. obs. 8.

(e) v. *Rhodius* cent. 3. obs. 2.



autem hi, quamdiu tranquilli in situ suo primitivo permanent, neque exitum per choledochum ductum moliantur, sine ictero insequente vel alio ullo fanitatis dispendio per longos annos in corpore hærere possunt, testibus cl. *Lemery*, *Stiebero*, *Hoffmanno*, *Roncaglio*, *Hallero*, *Galeatio*, *Thornelio*, *Valsalva*, *Vatero*, *Morgagno*, *Ettmullero*, *Valisnero*, *Riedlino*, *Sculteto*, *Mortono*, *Pechlino*, *Reverborstio*. In cadavere viri fœnis, qui nunquam ictero laboraverat, tres calculos, magnitudine nucis avell-

lanæ



lanæ maioris, quadrangulares, in cystis
de fellea invenit clar. *Hannes*. Ast si-
mul ac relicto natali loco ingressum in
canalem angustiore[m] tentant hi calculi,
angulisque suis, quos habere solent, acu-
tis, teneras cystidis internas tunicas vel-
licare incipiunt, regium morbum pro-
ducunt (f).

Singulare præterea et mirandum pro-
fecto in fellis cystide phænomenon,
icteri

(f) *Zach. Vogel Anatomische, Chirurgi-
sche und Medicinische Beobachtun-
gen. Störck Ann. med. I. p. 150.* In
hoc casu intima ipsorum ossium sub-
stantia intensa flavedine tincta obser-
vabatur.



icteri non insolita causa, vermes sunt;
 infecta, quibus amara omnia inimicissi-
 ma esse novimus et ad quæ necanda ipsa
 animali bile non raro utimur. Hæc in-
 terdum in ipso hoc bilis promptuario di-
 versari, ibi nidulari, bene valere, cre-
 scere et augeri videmus. Ferunt casus
 hujusmodi *Ephemerides Naturæ Curiosorum* (g). Notat idem ex observatione
Galenii Wieri (h) *Fabricius Hildanus* (i)

tri-

(g) Decad. 2. art. 7. obs. 16.

(h) vid. Epist. ad *Hildanum* Düsseldorfii 16. Junii. 1602.

(i) Observ. chirurg. observ. 60. p. 61.



trigamque hospitem hujusmodi peregrinorum simul in vase hoc biliario detectam memorant *Commentaria Lipsiensia* (k). Producent regium morbum vermes, dum vel sub ingressum suum in ductu choledochi hærentes bilis in duodenum iter claudunt; vel dum actu in cystide habitantes rostro suo internas huius receptaculi parietes irritando stricture harum partium spasticas excitant.

Omnes hi ordine jam nominati he-

H 5 patis

(k) Tom. 14. part. 4. p. 664. in not.



patis cystidisque felleæ morbi icterum licet singuli producere possint, non tamen ubique illum progenerant (Testari hic *Gibsonum*, *Morgagnum* et *Petermannum* sufficiet) Verum si morbus simul accedat excretorii communis biliarii ductus et promptius et citius producitur flavus hic morbus. Nominabimus primarios ejus morbos, inquirenturi dein, num ex his icterus epidemicus noster produci potuerit.

Phlegmone corripì posse excretorium bilis communem ductum, vel ex ipsa
ejus



ejus fabrica, quam admodum vasculosam et nerveam nactus est, sponte patet. Hinc, quum tumere parti cuicunque inflammatae solenne sit, tumens autem in membranis suis quilibet canalis notabiliter angustetur, apparet clare, retardatam sic a canali suo præter naturam coarctato in itinere, exitu prohibitam, redditamque humoribus reliquis bilem, icterum satis cito producturam.

Aliæ præter hæc sunt et multifariæ, quæ ductum hunc biliferum vel arctare, vel claudere omnino possunt, cau-



fa. Tophis obturatum hunc ductum *Ben-*
netus vidit (1). Excrefcentias fungofas
 canalem hunc præter naturam omnino
 claudentes cum ictero inſequentem lethali
Nicolus obſervavit, ſimilesque notavit
 inſuperabiles auriginis cauſas in adver-
 ſariis anatomicis *Morgagni*, *Albucaſes* et
Donatus (m). Occalluiſſe hunc ductum,
 clauſum totum, natamque inde icterici-
 am lethalem vidit in ſenatore Veneto

Mauro-

(1) Theatrum tabidorum, exercitat. 20.
 p. 54. et 55.
 (m) De med. hiſt. mirab. lib. 5. cap. 3.



Mauroceno Aurelius Pallazzoli (n). Con-
cretum hunc canalem communem osten-
dunt tentamina medica Anglica (o) oc-
clusumque eundem a calculo cystico de-
prehendit *Störck* (p). Exsiccatum o-
mnino, chordæque musicæ similem hunc
meatum observavit cum *Rolfincio* (q)
Argenterius (r) Ab intusfusione seu
mutuo

(n) Annot; a *Carbario Zeno*, additis ad
vitam *Mauroceni*, a *Nicol. Crasso* con-
scriptam.

(o) Medical Essay. Tom. 2. no. 21.
pag. 310.

(p) In Anno medico I. jam citato.

(q) Epitome cur. lib. 3. cap. 8.

(r) Lib. 4. aphor. 2.



mutuo ingressu choledochum ductum
firmiter occlusum natumque inde icte-
rum pertinacissimum lethalem *Iob van*
Meekern in observationibus suis notavit.
Compressum ab hydatidibus, cystidi, ejus-
que ductui accretis, eundem hunc cana-
lem *Valsalva* refert, idemque memorant
Acta Academiae Scientiarum Petropolitanae.
Lunbricum verum teretem, ipsum cho-
ledochum ductum occupantem, in ca-
davere foeminino vidit cl. *Hannes*. Per-
foraverat hic hepaticum bilis ductum,
rostroque suo per factum vulnus pro-
minebat,



minebat, dum interim cauda sua in duodeno adhuc hæreret. Apud infantem, ex febre ardente, variis stipata symptomatibus, mortuum, cui tumidum fuerat hypochondrium dextrum, simulque facies atque oculi flavedine tincti, magnum in ductu hoc lumbricum repertum fuisse in cl. *Lieutaudii* Historia anatomico-medica, quam cl. *Portal* edidit suisque observationibus auxit, legitur (s). Observaverunt in ductibus biliariis hærentes lumbricos plures alii Medici illustres.

(s) Tom. I. pag. 210.



stres. Ramo hepatici ductus incuneata hæc infecta vidit cl. *Pallas*. Lumbricum spithamam longum in choledôcho canali detexit laudatus jam *Galenus Wierus*. Binos in hepatico et cystico ductu invenit cl. *Nebel*, suasque observationes *Actis Naturae Curiosorum* Tom. V. obs. 112. inferuit. Similis insuper visorum in choledôcho ductu lumbricorum historia habetur in *Ephem. Nat. Curios. Dec. 1. ann. 1. obs. 50.*

En rursus integram causarum ictero generando aptissimarum nubem! Periodicum

dicum



dicim^{us} nonnullæ ex his icterum creant,
ut lumbrici, phlegmone, calculi, simul-
que dolores creant enormes, vomitus,
febres, convulsiones, aliaque dira sym-
ptomata, qualia et epidemium nostrum
morbum concomitata ex parte fuisse, su-
pra monuimus. Omnes autem periodi-
cas morbi arquati species a calculis vesi-
cæ felleæ derivandas et insanabiles renun-
ciandas, uti hoc *Baglivio*, *Valisnero*,
Scheffelio, ipsoque *Swietenio* (t) credere
libet, nimium fortasse foret.

I

Quod

(t) Comment ad aphor. *Boerhaavii*, Tom.
3. pag. 134.



Quod si vero dolorum in morbo nostro sensationem stringentem, convulsivam, eorum ab infimo ventre ortum, progressum ad superiora, transitum ad ventriculum et cardiam, præcipitem morbi absque prægressa alia externa manifesta causa invasionem, summam statim violentiam, celerem subinde fugam, et subitum paroxysmi recursum, cum doloribus a calculo felleo, mearui cholecho impacto, nascentibus comparemus, qui scindentes et lancinantes esse, qui sedem in hypochondrio dextro fixam

occupare, qui per gradus ad summam violentiam, absque ulla symptomatum remissione augeri, quinimo ad dorsum, scapulas ipsumque jugulum diffundi (u), nausea tandem vomitibusque gravissimis, ad ileum nonnunquam accedentibus, stipari solent, patet facile, ex calculis talibus, qui præter hæc senio, quam teneris ætatibus, familiares esse observantur (v), morbum hunc progenitum non fuisse. Conferri pro distinctione colicorum dolorum ab iis, qui a calculo cystico

I 2 cientur,

(u) *Bezold* dissert. cit.

(v) *van Swieten* l. c. p. 132.



cientur, omnino hic meretur Tractatus ille, quem Anglico sermone *de concretionibus biliosis* scripsit cl. Coe (w). Cystidis vero affectiones ab hepatis phlegmone vel abscessu dignoscere docuit optime *Petitus* (x).

Neque et propter febris inflammatoriae absentiam, pulsusque in nostro morbo rardum, parvum et contractum de phlegmone organorum biliariorum vel cogitare licebat; uti nec de aliis, vel cystidis

(w) cap. 3. p. 142.

(x) Memoires de l'Academie de chirurgie Tom. I.



dis ipsius, vel ductus ejus excretorii de-
figurationibus, quæ omnes chronicis po-
tius morbis producendis aptiores judi-
cantur.

Aliam regii morbi causam ipsa bilis
præbet, a sana et naturali sua crasi rece-
dens. Fertilissima hæc icteri mater est,
diversasque producit, pro vario corru-
ptionis suæ gradu, hujus morbi species,
periculosas omnes, longas et difficilis sa-
nationis. Sed quum in substrato casu
nullum præcefferit organorum bili pa-
randæ sacrorum notabile vitium, nullum



vel chylicationis vel nutritionis læsa
signum, nulla circuli humorum per ab-
domen interrupti vel remotissima nota,
nulla denique illorum, quæ a bile mor-
bosa acri, viscida, putri, flava, exusta,
humoribus reliquis vel affusa, vel du-
ctus proprios obturante, in actiones vita-
les, animales vel naturales redundare so-
lent, damnorum, per sua signa cetero-
quin facile detegendorum minima su-
spicio, ideo et hanc quoque in nostro
morbo insontem merito renunciamus.
Confirmavit hoc insuper frustraneus re-
mediorum



mediorum resolventium, aperientium, bilemque spissam fundentium, sub varia forma adhibitorum, usus.

Una superest bilis prava constitutio, ad nostrum casum fortassis referenda, dolorum atrocium, colicorum, spasmodicorum, diarrhoeæ biliosæ, convulsionum, morbique arquati interdum causa; tenuitas bilis morbosæ. Solvitur nonnunquam a veneno, miasmate nocivo, febre intensa, tabo putrido, vel ab organorum cholopoieticorum, vasorumque cystidis absorbentium labe bilis, tantamque ac-



quirit tenuitatem, ut ipso sero dilutior
 (y) a vase suo non coercenda, vel dif-
 fluat in vasa vicina lymphatica, sicque
 sanguini admisceatur, vel per poros cy-
 stidis transfudet (z) appositaeque sibi in-
 testina acri suo et mordaci stimulo irri-
 ret, ad spasmos provocet, variaque sic
 produ-

(y) *Regn. de Graaf* de succo pancr.
 cap. 8. *Godart* journal de medicine
 T. 18. mens. apr. 1763.

(z) *Tulpii* obs. lib. 2. cap. 27. *de Haen*
Rat. med. tom. 10. p. 31. Ipsa abdo-
 minis externa integumenta a bile per
 poros cystidis colata croceo colore in-
 terdum tingi notant *Misc. Nat. Cur.*
Dec. 2. ann. 1672. obs. 100. Rever-
borst de motu bilis § 25.



producat ex his progerminantia mala, sæpe fatalia. Rodit hæc in abdomen effusa bilis non solum externas intestinorum membranas, teste *Hoffmanno* (a) easque ad putredinem cito disponit, cuius rei exemplum *Ephemerides physico medicæ Germanicæ ann. 3. obs. 100* ex relatione *Fribenii* exhibent; sed resorpta quoque et in cavum intestinorum ipsum penetrans corrupta eo gradu bilis gravif-

I 5 fima

(a) Oper. tom. 5. cap. 3. obs. 3. p. 278.



fina ibi producit fymptomata (b); fan-
guini autem affufa affectiones creat,
morte ut plurimum terminandas. Sola
nobis hic exemplo fit icterica, infulis
Caribæis zonæque torridæ endemica fe-
bris, maligna, maximeque perniciofa,
Anglis *the yellow fever* dicta. Hæc testi-
bus cl. *Markitrick*, *Wiliam Hillary*,
Huck, *Linning*, a foluta in putrilaginem
et admixta humoribus reliquis bile na-
fcitur. Quanta hic totius microcosmi
pertur-

(b) *Guettard* in *Comment. Acad. Sci-*
ent. Paris. 1759. Stalpart van der
Wiel. cent I. obf. 47. p. m. 204.
conf. v. Swieten comment T. 3. p. 97



perturbatio! quam præceps destructio!
quæ symptomatum ferocia! Perlegisse
non poenitebit *Ioh. Moultrie* Dissertati-
onem *de febre maligna biliosa Americæ*
a cl. *Baldingero* de novo editam. Neque
mirum; adeo nocivam enim soluta sic,
præsertim a putredine, bilis naturam in-
duere potest, ut præsentissimum anima-
libus venenum fiat. Refert exemplum
tale cl. *Morgagni* in libro de causis et
sedibus morborum per anatomen inda-
gatis Tom. 2., ubi non solum cultellus
bile hujusmodi madidus variis animalibus



bus lethalia intulit, quamvis cutim vix penetraſſent, vulnera, ſed pauca quoque guttulæ, pani inſtillatæ et ingeſtæ, animal cito trucidaverunt. Notat idem in inſtitutionibus phyſiologicis *Hallerus*.

Tanta autem bilis a ſtatu naturali aberratio, quum absque notabili viſcerum prægreſſa labe, tam per propria ſua ſigna, quam per læſas exinde corporis functiones diverſas, facile dignoſcenda, contingere nequeat; horum autem omnium in epidemico noſtro morbo ne veſtigium quidem obtinuerit, et ex hac cau-



sa icterus noster neutiquam proxime
prodiit.

Restat alia adhuc morbi arquati, nec
infrequens omnino causa, monstrosa nem-
pe partium, cystidi felleæ et ductui cho-
ledocho vicinarum, configuratio præter-
naturalis, qua mole enormes ductum
bilis excretorium vel arctant, vel o-
mnino claudunt. Sic v. gr. ab extensione
intestini duodeni a flatibus interceptis et
compressio sic biliario ductu icterum ge-
nitum *Sylvaticus* notat (c). Nec diffici-
lem hanc flatuum interceptionem alicui
(c) cent. 3. obs. 4.



visuram existimo, cui intestini duodeni ~~ter~~
geminam reflexionem, recurvum ductum,
locumque, quem occupat, undique mire
modo circumscriptum ex anatome novisse
obtigit. Pauci ex anatomicis apocry-
phum hunc duodeni situm rite extrica-
verunt, sive ex neglectu, vel difficulta-
te rei factum fuerit, non inquiram. Hoc
solum hic notasse expedit, dignissimam
lectu et applausu illam dissertationem
esse, quam *de duodeno plurium malorum*
sede Hoffmannus dedit. Jcterus a pyloro
seirrhuso ~~exitum~~ bilis in duodenum pra-
pediente



pediente in *Actis Helveticis* Tom. 5. legitur. A flatibus, intestinum colon dis-
cendentibus ductumque choledochum
occurrentibus, icteri exemplum tradidit
Bonetus (d). A pancreate scirrhus eun-
dem hunc morbum productum memo-
rat *Thomas Bartholinus* (e) celebrisque
Galeati (f). Ab ejusdem huius visceris
infarctu morbum regium genitum refert
citatus jam saepe *Bonetus* (g). A ductu
pancrea-

(d) *Sepulchret. anat. tit. de febr. lib. 4.*

(e) in *Actis medicis ann. 1674-76*

(f) in *commentariis Bononiensibus* Tom.
4. art. 2.

(g) *Sepulch. anat. tit. de vomitu lib. 4.*



pancreatico, materia tophacea calculosa
 oppleto et extenso sic, ut totum simul
 choledochum ductum compresserit, bilis-
 que effluxum omnino prohibuerit, icte-
 rum natum ex demonstratione cl. *Mes-
 selii* recenset *D. Koreff* (h). A variis
 lienis vitiis icterum generari docet *Ve-
 salius* (i). A liene calculoso icterum vi-
 dit cum *Fontano* (k) *Bonetus* (l), qui
 et

(h) Diff. inaug. quæ theoreticam conli-
 derationem icteri, novis quibusdam
 causis simul superstructam, exhibet
 . Halaë 1758.

(i) De humani corporis fabrica lib. 5.
 cap. 9.

(k) Respons. et cur. p. 90.

(l) Loc. sæpe cit. lib. 4. tit. de cachexia.



et a corrupto liene auriginem nasci observavit. A venarum mesentericarum infarctu icterum productum narrat *Helmontius*. A glandulis induratis, ductum cysticum comprimentibus, arcuati morbi genesin describit laudatus jam *Bonetus* (m). A scybalis duris, in intestinis, præcipue colo, accumulatis, ductum choledochum aliquando comprimi et fieri icterum, censet cl. *Swietenius* (n). A tumore hydropico tubæ Fallopiæ enormi compressum excretorium bilis ductum

K

ctum

(m) loc. cit. tit. de febribus.

(n) Comm. in aphor. Boerhaavii § 918.



tum icterumque progenitum memorat
Dekkerus (o). Taceo plura alia notata
ab observatoribus icterorum, a similibus
causis natorum, exempla. Hoc unum so-
lum addam; nasci nonnunquam in gra-
vidis ultimo gestationis tempore icterum,
urgente adeo partes abdominales sibi vi-
cinas utero, ut compressus choledochus
ductus bilis in duodenum viam interci-
piat (p). Hæc autem auriginis species
statim

(o) Exercitat. pract. cap. 8. § 689.

(p) *van Swieten*. l. c. p. 95. *Hoffmann*.
Oper. Tom. 7. p. 374. *Storch*. 4. Me-
dicinischer Jahrgang p. 231.



statim post exclusum in partu foetum
sponte solvitur.

Omnia autem hæc et singula, quum
visceris cujusdam abdominalis deturpati-
onem solennem prægressam supponant,
in præsentī autem casu, ratione habita
morbi ejusque symptomatum, de labe
aliqua latente organica alicujus visceris,
uti sæpe jam monuimus, non constit,
hanc quoque causarum classē merito
præterimus, festinaturi ad aliam non mi-
nus foecundam icteri matrem, spasmo-
dicam nempe partium bili vel segregan-



dæ, vel excernendæ destinatarum stric-
turam.

Frequens hæc icteri causa, et frequen-
tior quam vulgo creditur. Mirum pro-
fecto, quod magni quoque artis nostræ
viri de hac ne quidem cogitaverint; poti-
us ingenia sua anxie torserint ad expli-
canda varia morbi regii symptomata;
quæ tamen ex spasmo partium deduxit-
sent et certius et facilius. Hæc illa icteri
causa est, quæ in cadaveribus hominum
ab hoc morbo extinctorum nullum sæ-
pe sui vestigium relinquit, visceraque
omnia



omnia exhibet sanissima, cujus phænomeni exempla plura memoriæ prodiderunt *Morgagni*, *Mangetti*, *Bonetus*, *Gaber* (q).

Ut autem clarior lectori sim, nonnulla, quæ ad pleniorē mox dicendorum intellectum circa fabricam organorum biliariorum scitu necessaria judico, paucis hic exponam.

Secernitur in hepate singulari artificio bilis. Hæc per vasa singularia, a veteri-

K 3

bus

(q) *Miscell. philos. mathem.* Tom. I. ann. 1759. p. 75. Conf. *Hoffmanni* oper. T. 7. c. 12. § 8.



bus *pore biliarii vocata*, ductui hepatico, ex prioribus composito, infunditur, per quem sub *bilis hepaticæ* nomine vel re-cta in duodenum abit, vel in cystidem delabatur, ubi, loci calore foras particulis suis fluidioribus castrata, *bilem cysticam* constituit, pariter duodeno destinatam. Triplex ergo revera bilis erit, hepatica pura, cystica pura, et quæ ex utraque hac in choledochæ mixta nascitur, secundum naturam duodeno infundenda.

Cystis ipsa, inferiori concavæ hepatis
parti



parti appensa, vas est membranaceum molle, extensile, pyriforme, ex basi vel fundamento latiori in angustius collum desinens, quod in *ductum cysticum* continuatur. Canalis hic aliquantum progressus ad *ductum hepaticum* accedit, cumque hoc conjunctus *ductum communem choledochum* format, duodeno inferendum.

Structuram vesiculæ felleæ ductuumque propriam quod attinet, similem illam nacti sunt cum duodeno, sed tene-riorem. Easdem numerant, iisdem usibus destinatas, tunicas, exteriorem com-



munem a peritonæo productam, muscularem alteram, ex fibris longitudinalibus, spiralibus et sese invicem varie decussantibus compositam. Negat has cystidis felleæ ductuumque biliariorum fibras musculares in Dissertatione sua inaugurali, quæ singularia quædam sistit, ad vesicam felleam ejusque bilem spectantia D. *Lorentz*, sententiam præceptoris sui, *Cassebohmi* forte secutus. Vellem autem, majore moderatione in defendenda hac, ipsi autopsiæ contrariante thesi, esset usus, virisque et candore et subtilitate anatomica



celebribus pepercisset magis. Tunicam hanc muscularem tertia excipit nervea seu vasculosa, vasis omnium ordinum ditissima. Quæ internam tandem superficiem tegit, quarta, villosa est, jugis variegatis plexuosis, varie revolutis ita concinne distincta, ut reticulata ab anatomicis vocari meruerit. Notandum tamen, tunicam hanc villosam in ipso choledochoductu teneriorem multo observari, quam in cystide ipsa.

Memorabilis profecto modus est, quo choledochus hic ductus duodeno jungitur.



Simulac ad primam circiter flexuram intestini ductus hic pertingit, externa statim ejus tunica tunicae duodeni extimae continuatur; quo facto muscularem alteram ab eodem hoc intestino similiter mutat. Transeunt nempe a musculari tunica duodeni, quot ad formandam membranam muscularem cystidis ductuumque biliariorum requiruntur, fibrae, descendunt ad ipsum vesicae felleae fundum, unde reduces in fibras musculares intestini denuo continuantur. Aliae longitudinales duodeni musculares fibrae ab in-



vicem, secedentes ductum ipsum intercipiunt, sinu foveant, plicamque istam formant, quæ in interna duodeni superficie, hic loci conspicua, ostiolum excretorii hujus ductus velat, illudque, si a quacunque causa fibræ hæ tendantur, omnino claudit. A spiralibus intestini fibris muscularibus nonnullæ statim ipsi ductui choledocho impenduntur, ad imam cystidis basin producendæ; aliæ, ostiolum hujus ductus circumambientes, sphincteris officio prius funguntur, antequam cum sociis suis ductum communem intrent.



trent. Par omnino ratio est tunicarum reliquarum tam nerveo vasculosæ, quam villosæ. Continuantur etiam hæ in membranas ductus choledochi, eique ut et cystidi felleæ vasa sua et nervos communicant. Nacta tamen est cystis ejusque ductus ex hepate quoque tam vasa quam nervos.

Sufficient hæc pro nostro scopo. Vidimus sensus instrumenta, nervos. Vidimus et motus instrumenta, fibras copiosas musculares. Vidimus partium mirabilem nexum. Spastice ergo constringi
posse



posse partes jam memoratas, poros biliarios, ductum hepaticum, cystidem felleam ipsam, ductum cysticum, communemque choledochum canalem, vel singulas, vel conjunctim omnes, vel unam vel alteram ex his, intactis reliquis, ex antecedentibus manifesto constat. Neque defunt natorum ex hac causa icterorum exempla. Sic ab hepatis constrictione spasmodica regium morbum a se visum asserit *Helwigius* in historia morborum, qui ab anno 1699 ad 1702 Vratislaviæ grassati sunt. A spasmodica capsulæ *Glissoni-*



ana stricture icterum productum notant
Commentaria Norimbergensia ann. 1733
hebd. 2. (r). A contracto per spasmus
ductu cystico arquatum morbum *Veslin-*
gius vidit, citatusque jam sæpe *Morga-*
gni (s). Constrictum in hivio suo bilia-
rem ductum, insuperabilem icteri cau-
sam, in *monitis medicis* notat cl. *Mead*.
Natarumque ex convulsiva choledochi du-
ctus coarctatione auriginum exempla alia
dederunt *Hoffmannus* et *Morgagni*.

Quæ.

(r) conf. *Morgagni* Epist. anat. 37. art. 10.

(s) l. c. art. 10. it. *Storchi* libr. de
morb. inf. Tom. 1. art. 26. p. 382.



Qualibet sic constricta pars icterum
producit sui generis, ab alio diversum,
per colorem, quem corpori externo con-
ciliat, dignoscendum. Aliam enim he-
patica bilis, aliam cystica, aliam mixta,
aliam sana, aliam per varios gradus mor-
bosa bilis flavedinem corporis externo
habitu inducit, si cum humoribus mi-
sceatur. Varias has colorum in ictericis
diversitates a dilutissima flavedine ad ni-
grorem fere usque, optime *Aræus* ex-
hibuit in libro suo de causis & signis
morborum diuturnorum l. I. c. 15. ad
quem



quem ergo brevitatis causa lectorem ab-
lego. Firmiter autem feremus de loco
sic affecto iudicium; si simul ad fecum
alvinarum colorem habita ratio fuerit.
Sic v. gr. faeces alvinæ gryseæ, siccæ,
ductum choledochum, simul cum ostio
suo, quod in duodenum hiat, constri-
ctum arguunt. Idem hic communis bilia-
ris ductus, prope bifurcationem suam
clausus, faeces exhibebit gryseas, chylo-
sas. Ductus cysticus ante conjunctionem
suam cum ductu hepatico in cystidis
vicinia spasmodice contractus, vel alio
modo



modo obstructus, excrementa straminea dabit; quum simili modo affectus vel hepaticus ductus, vel biliarii aliquot pori, nullam omnino facum decolorationem comitem habeant; quamquam icterum nihilo minus generent.

Spasmodicæ hæ stricture, quas obtinere non raro in systemate biliario ex antecedentibus jam vidimus, duplici ratione fiunt; vel *idiopathice*, a causa ipsi his partibus male affectis inbærente, morbosa; vel *sympathice*, a causis alibi quidem latentibus; quarum tamen effe-



ctus in has quoque partes per consensum transit.

Præterea fit 1) dum bilis acrior, atra, putris, internam et maxime sensibilem organorum biliariorum tunicam rodit partesque sic ad stricturas violentas determinat; 2) dum calculus vel hepaticus vel cysticus, angulosus, quales hi omnes esse solent, margine suo acuto teneras memoratorum canalium membranas forti stimulo læcessit, sicque ad contractionem spasmodicam involuntariam provocat; 3) dum post violentam a pertransitu calculi maj-

joris



poris natam horum ductuum extensionem,
spasmus insequens eos præter naturam
arctat. Cujus exemplum *Junckerus* in ver-
bi divini quodam ministro vidit, qui
post excretum inter dira symptomata præ-
grandem cholelithum, per decem dies
continuos icterum sustinuit, nulla arte
solubilem; 4) dum vermes, vel in he-
pate, vel in vesica fellea hospitantes,
vel morfu vel agitationibus suis, inter-
nas harum partium irritabiles maxime
parietes laceffendo, ad spasmodicas con-
tractiones illas sollicitant; 5) tandem



idiopathice per spasmum constringitur biliaris ductus, si, uti jam in antecedentibus notavimus, nimium extendatur ipsa bilis vesicula. Morbus hic, admodum pertinax, difficillimæ sanationis, periculique plenissimus est. Clauditur in hoc casu arctissime cystidis collum, stringiturque sic, ut crepare potius felleam vesiculam, quam unicam contenti liquidæ guttulam dimittere videamus. Curam hujus affectus, ejus diagnosis, ipsamque cystotomiæ operationem, optime exhibuit cautelasque necessarias adjecit. cl.

Petit,

Peris, ubi ex fonte ipso haurire poterit lector. Omnium autem citatarum mox icteri spasmodici idiopathici causarum, quum in epidemico nostro morbo obtinuerit, manifestis hoc docentibus signis, nulla, necessario unus ille, qui restat, stricture spasmodicæ modus, nempe *consensualis* arquatum nostrum intermittentem morbum produxisse merito censendus.

Rapi in mutuos consensus partes humani corporis, etiam dissitissimas, unanimis medicorum observatio est, primæ



artis infantiae jam coeva. Stupens universalem hanc totius microcosmi sympathiam admirabundus jam Hippocrates exclamabat (t) *Confluxio una! conspiratio una! consentientia omnia!* Pulchre consensum hunc partium extricavit cl. Rega in libello suo laude nostra majore de hoc themate conscripto, exhibuitque varios hujus sympathiae modos cl. Rocholl in Dissertatione inaug. *de consensu primarum viarum cum perimetro corporis humani.*

Recen.

(t) Libr. de Aliment. § 4. p. 595.



Recensebimus hic principes hujus confraternitatis causas; deducturi ex his, quo pacto et fellea cystis biliariique ductus in partium vicinarum morbosam trahantur societatem.

Prima consensus mutui partium causa habetur *nexus nervorum*. Qui a communi radice cerebro ejusque oblongata medulla enati omnes, et in universas corporis partes miro subtilitatis artificio diffusi, totum corpus amico inter se vinculo ligant, ita, ut laceffita quacunque ejus vel extrema parte, in remotissimam non solum



nictu oculi citius transeat ingrata applicati stimuli sensatio (u); sed ut reactio quoque violenta, quam spasmus vocamus, non raro exinde producat. Sic circumscriptus ille, pollicare spatium vix occupans, capitis dolor fixus cum frigoris sensu generaliter conjunctus, quem clavum hystericum vocant, ab utero male affecto ut plurimum pendens, (v) ab hac causa derivatur. Referendæ non minus huc erunt epilepsiæ illæ infantum,

a

(u) *Halleri Elem. Physiol. Tom 4. pag. 322.*

(v) *Lettmulleri Colleg. pract. p. 464. Langii Eput. Med. L. 1. p. 246.*



a dentitione difficili (w); aphonia illorum a vermibus (x); paralysis illa totius sinistri lateris, quam a renum calculo, exitum moliente, productam vidit *Haenius* (y); tussis illa convulsiva, quam in virgine quadam toties nascentem observabat *Robertus Whyt*, quoties in lineam rectam extenderet crus (z); spasmus ille inferioris maxillæ (Mundklem-

L 5 me).

(w) *Hoffmann* Med. Rat. Syst. Tom. 4. .
Sect. 2. Cap 5. . p. 326.

(x) *Rega* Tract. de consensu part.
cap. 8. p. 137.

(y) *Method. med. in nos. pract.* Tom.
4. cap. 8. no. 5.

(z) *Tractatus de morbis nervosis* cap. 1,



me) quem a clavo inter metatarsi ossa infixo *Cleophane* memorat (a) quemque a tendine digitorum flexore lacerato genitum in observationibus modo citatis medicis anglicis tom I. art. I. *Sylvester* refert; omniaque tandem illa symptomata, quæ a puncto tendine totam circumagunt corporis compagem (b). Conferri hic meretur cl. *Raulin* Traité des affections vaporeuses du sexe &c.

Altera consensus partium causa fita est
in

(a) Medical observations and inquiries
Tom. I. art 7.

(b) Conf. *Ambros. Paræi* observ. de
Carolo IX. Rege Gallix



in speciali quodam *nexu vasorum*. Hinc partes illæ, quibus ex communi vel a fini trunco vasa sanguinea accepisse obtingit, morbos sibi suos, sensationesque vividiores communicant. Sic uterum cum mammis conspirare vel mulierculis nostris notissima res est. Derivat hunc consensum a sanguine ab utero refluxo auctor nuclei Hippocratis Aphor. Cent. III. aph. 44. Videmus flaccescere instante abortu mammas (c) et emarcescere mortuo foetu (d). Post suppressionem menses,

(c) *Hippocrat. Aphor* 37. & 53 sect. 5.

(d) *Röderer Elem. art. obitetr. Cap.*
16. §. 380.



sum, fiat hæc a morbo, vel a graviditate, mammarum intumescencia sequitur, crescunt illæ, et dolent interdum (e). Vicissim, si nimium doleant ab ingressu lactis, præsertim in primiparis, mammae, supprimuntur lochia (f). Eodem hoc fundamento nititur ille, quem inter lienem et jecur intercedere novimus consensus (g). Jungitur simili modo cum ventriculo lien, ita ut uno

ex

(e) *Rœderer* l. c. Cap. 7. §. 124. & 140.

(f) *Rege* de Consensu partium Cap. 15. pag. 265.

(g) *Baglivii* Praxis p. 373.



ex his visceribus vitiato, transeat mox in aliud morbus (h); cujus exempla plura collegerunt *Wedelius, Dolæus, Hoffmannus, Stablius* aliique.

Singularis ex hoc vasorum nexu, circuli-que humorum mutatione præternaturali proveniens icteri causa est capitis vulneratio. Contingit sæpe, vitari post vulnera cranii penetrantia, felicissime licet jam sanata, hepar. Dedit ipse in descriptione constitutionis nostræ epidemicæ hujus rei exemplum. Dederunt

(h) *Morgagni* Epistol. anat. 36. art. 28
pag. 72.



unt plura *Bertrandus*, *Browne Cheston*,
Pouteau, alii. Hinc aurigines quoque
exinde nasci mirum nemini videbitur.
Notavit a læso capite icterum cl. *Baldinger*
in Tractatu de morbis castrensis
additque simul, lethale ut plurimum
symptoma fuisse post prælium *Kesfeld-*
dorfinum capite vulnerato militi *Austria-*
eo supervenientem icterum. Confirmant
hæc experientia sua *Bartholinus* et
Hoechstetter.

Alius partium consensus fit per continu-
ationem seu propagationem membranarum



et tela cellulosa. Ex hoc fonte magni
sane emergunt et stupendi in microco-
smo effectus. Hinc oris, nasi, faucium
totiusque intestinalis tubi commercium
non leve; pruritus narium a vermibus,
vel alia causa intestina irritante (i); vo-
mituritiones ab irritatis faucibus; labii
inferioris tremor a disposito ad vomien-
dum ventriculo (k); tormina, alvini-
que fluxus et dejectiones acidæ ab irritan-
tibus; gingivas dentibus erupturis (l);
glandis

(i) v. *Swieten* Comment. Tom. 4. p.
713.

(k) *Piso* libr. 3. part. 7. cap. 7.

(l) *Hoffmann*. M. R. S. Tom. 4. sect.
2. cap. 5. p. 326.



glandis penis dolor et pruritus a renum, ureterum vel vesicæ affectionibus, præsertim calculosis (m). Magna ex eodem fonte fluit consensio illa inter externum corporis corticem et primas vias; de qua uberius *Rocholl* et *Bonn* (n). Hinc colici illi dolores, quos ex pedum refrigerio gravissimos vidit *Brassavolus*; ischuriæ illæ, quæ a rigore tetanoide oriuntur, quarum *Hippocrates* meminit in *Coac. Prænot.* 25. & 29 edit. *Foesii* it. *Bellini* in libro de urinis ad § cit. p. 54; pareses illæ

(m) *Haller* prim. lin. physiol. p. 395.

(n) *Dissert. inaug. de continuatione membranarum.* Lugd. B. 1763.



a doloribus colicis spasmodicis, quarum
Ettmüllerus in collegio practico meminit
p. 160; paralyfis illa artuum, quam a
doloribus colicis notavit in notis ad *Po-*
zerium Hoffmannus p. 101, quamque ex
incautijs exhibita jalappæ refina *Rega-*
vidit (o). Eandem plane causam agno-
scit nata ab incauta pedum refrigeratione
aphonia, quam *Hoffmannus* describit (p),
facilisque transitus dolorum arthritico-
rum in colicos, colicorum in articulares
(q). Nituntur hoc fundamento curationes
M illæ
(o) Libr. iam cit. cap. 16. pag. 279.
(p) Loc. cit. Tom. 4. cap. 7. obs. 2.
(q) *Hippocrates* Libr. de humoribus in fine,



illæ, multis apocryphæ visæ, ubi exter-
 nis corporis partibus, ad internos sanan-
 dos morbos, apponuntur medicationes,
 Dum v. gr. *Savonarola* ferenissimum
 Ferraræ Ducem alvi obstructione perti-
 nacissima, omnibus adhibitis remediis
 renitente, lobarantem, infusa pedibus
 aqua gelida sanabat; quamque methodum
 felicissimo cum successu imitatus est et
Pringle illustrisque *Stevenson* (r). Hinc
 tanta pediluviorum ad obstructions spa-
 simos-

(r). vid. Acta Edinburgensia. Tom. 9
 Art. 77.



smosque intestinorum resolvendos virtus est, quam *Hoffmannus* (s) deprædicateat, expertusque est in colica biliosa convulsiva *Robert Porter* (t). Lectu perquam digna circa hanc rem dissertatio illa est, quam de spasmo externorum ratione ad viscera indeque oriunda morborum complicatione Halæ 1762 conscripsit cl. *Strümpfer*. Profecto claram hujus nexus ideam habere medico practico convenit in variis et periculosis

M 2

acutis

(s) M. R. S. part. patholog. morb. spec. tit. de spasmis et convulsionibus particularibus sect. 2. cap. 5.

(t) Act. Edimb. Tom. 3. obs. 27.



acutis morbis, præfertim exanthematicis.

Quarta consensus ratio *in similitudine fabricæ et officii* sita est. Hæc organa se-et excretoria arctissimo inter se vinculo ligat. Sic, rene uno male affecto, compatitur alter (u); uno spasmodice constricto, vel obstructo, officii sui immemor fit quoque alter (v); dolente uno condolet alter (w). Idem
circa

(u) Fränkische Sammlungen von Anmerkungen aus der Naturlehre vol. 5. part. 26. no. 6.

(v) Ettmüller colleg. pract. p. 209. Forest libr. 24. obs 26. Marchetti anat. cap. 5. Riolan Anthropol. L. 2. cap. 26.

(w) Baglivi Anat. fibr. f. 420.



circa oculos obtinet. Dolere et rubere videmus unum, si irritetur alter; phlegmone affecto uno, inflammari et rubere alterum (x). Quin illum quoque consensum, quem inter renes et hepar intercedere toties observamus, ex hoc fundamento, similitudine nempe fabricæ, derivare nititur in Historia Acad. Reg. scient. Gall. a. 1749 cl. *Ferrein*.

Trahuntur tandem in mutuos consensus partes sibi vicinæ; transit ex una in aliam sensatio læta, dolor, spasmus,

M 3 morbus

(x) *Rega Loc. cit. cap. 18. p. 318.*



morbus qualiscunque, mors. Sic amicissime inter se consentiunt ventriculus, hepar et septum transversum (y). Hinc tussis illa convulsiva nascitur a materia acri in ventriculo hærente, quam emesis curat, notante *Hoffmanno* (z), viceque versa vomitus a tussi violenta. Sic vermes intestina mordentes sæpe dolores producere visi sunt pleuritidem mentientes; advertentibus hoc *Ballonio* (a),

Gabu-

(y) *Vieussens* Neurolog. p. 184.

(z) *M. R. S.* Tom. 3. sect. I. cap. 5. § 28.

(a) *Epidem.* Libr. I. pag. 21.



Gabucino (b), *Riverio* (c), *Hoffmannio* (d), *Pringlio* (e), *Baldingero* (f), *Hannefio* (g) *Lentino* (h) aliisque; an-
samque hæc materia cl. *Delio* dedit dis-
sertationis suæ inaug. *de consensu pecto-
ris cum abdomine*. Pertinet huc ischuria
illa, quam a male affecto utero nasci ob-

M 4 fervavit

(b) vid. Boneti sepulch. lib. 2. sect. 4.
obs. 38.

(c) Observ. cent. 1. obs. 75.

(d) Med. rat. syst. T. 3. sect. 1. cap.
7. § 53.

(e) von den Krankheiten einer Armee,
cap. 4.

(f) von Armeekrankheiten p. 277.

(g) de puero epileptico foliis aurant.
rec. ferv. p. 15.

(h) Observ. med. fasc. 1. obs. 20.



servavit *Blum* (i); dysuria ab ulcere intestini, cujus historiam *Zwingerus* exhibet in *Actis Helvet. Physic. Mathem.* Vol. IV p. 231; urinæque tenues a constrictis tubis renalibus bellinianis per consensum a spasmis intestinorum natæ.

(k). Simili modo afficiuntur a vesicæ morbis intestina ipsa. Spasmos eorundem a calculo vesicæ notavit *Langius*

(l). Alvi adstrictiones ab inflammatione

cystidis

(i) *Dissert. de ischuriæ causis Helmst.* 1736. § 20. p. 17.

(k) *Hoffmann* loc. cit Tom IV sect. II. cap. 2. obs. I. p. 241.

(l) *Epistol. Med.* 45. p. 198.



cyttidis urinaria vidit *Bausnerus*; refert
que inter communia calculi vesicæ sym-
ptomata flatulentias, nauseus et vomitus
Hoffmann loc. sup. cit. - tom. III. sect. I.
cap. 5. § 29.

In omnibus ergo corporis partibus,
ubi ex memoratis his consensus mutui
causis una vel altera adest, sympathia
quoque nascitur manifesta, sic ut unius
partis affectiones transeant in alteram;
idque tanto certius et citius, quo plu-
res memoratarum communicationum
modi simul obtinent. Quanta ergo in



tercedet inter illas partes amicitia et fraterna communio, ubi omnes illæ hujus commercii causæ confluunt in unum? Et revera inter ductus biliarios et canalem intestinorum omnia hæc deprehenduntur, recensita jam, nexus intimioris mutui genera. Communes partibus his sunt ex pare octavo et intercostali nervi (m). Vasa sanguifera ex eodem fonte ventriculus, duodenum, choledochus ductus, et partim cystis hauriunt.

Propa-

(m) *Willisus* de cerebro cap. 24 & 25 tab. 11. *Hoffmann.* Patholog. morb. spec. sect 2. cap. 6. § 9 p. 412.



Propagantur duodeni omnes membranae
in ipsas ductuum biliariorum cystidisque
tunicas. Par ambobus est fabrica; offi-
cium simile; vicinitas appositissima. Quid
ergo mirum, si quovis modo affectus
vel ventriculus, vel intestinalis tubus,
pathemata quoque sua ductui biliario
cystidique communicet, et quidem prom-
tissime. Sic irritatis v. gr. per purgan-
tia intestinis, elicitur e receptaculo suo
quoque bilis, excernitur per alvum.
Incitato ad vomitum ventriculo, statim
post aliquot factas evacuationes, emul-
getur.



getur simul duodenum, et cum hoc organa quoque biliaria; eructant hæc liquida sua contenta in duodeni cavum, unde mox retrogrado motu sursum in ventriculum rapta per vomitum ejiciuntur. Hinc est, quod ipsas quoque calculosas vesicæ felleæ concretiones hac methodo ex cystide prolici, in ventriculum elevari, vomituque reddi subinde videamus. Sic rejectos vomitu, per exhibitum corticem sambuci medianum excitato, viginti felleos calculos vidit in icterico quodam *Hoffmannus* (n) cum auri-

(n) Med. rat. f. tom. 4. sect. 2. cap. 3 obs 2.



auriginis infecuta sanatione. Simile evacuatum per emesin calculorum exemplum in operibus suis adfert ex communicatione *Henrici Ruffi*, Medici Samarcellensis *Riverius* p. 566. no. 4. Confirmat idem observatis suis cl. *Huxhamius* et qui ex hoc maxime hausit *Thomas Coe* (o). Hæc quoque ratio esse videtur, cur in morbis vesicæ felleæ calculosis vomitum arte provocare, provocatumque per decoctum hordei melilitum tepide hauriendum sustentare do-

ceat.

(o) *Treatise on biliary concretions* p. 73.



ceat in Commentariis ad § 950 aphor.
Boerhaavianorum Swietenius. Sæpe in
transitu hoc mutuo affectionum morbo-
sarum circulus quasi fit. Elicitur v. gr.
a leviori intestinorum, a quacunque cau-
sa excitato, spasmus bilis naturali co-
piosior; infunditur intestinis, irritat hæc,
fitque diarrhoea. Emulgetur ab excita-
to hoc alvi fluxu major adhuc bilis co-
pia; major ergo nascitur tubi intestina-
lis a bilis influxu irritatio, augetur spa-
smus, nascuntur colici insuper dolores,
qui nonnunquam adeo augentur, ut



in choleram brevi transeant, cui ab aucto magis magisque intestinorum spasmō, productaque hinc simili choledochi ductus constrictione, icterus non raro succedit. Ex eodem hoc inter partes has obtinente commercio cardialgiæ nascuntur a morbis cystidis, auriginesque illæ, quas a variis intestinorum irritamentis generari, nunc monstrabimus.

Omnia ergo illa, quæcunque ventriculo & intestinis praternaturalem hujusmodi constitutionem imprimere possunt, ut in spasmodicas stricturas conjiciantur,



tur, cystidem quoque felleam ductusque biliarios in affectionum harum societatem rapiunt, bilis in duodenum effluxum impediunt, producentque illam icteri speciem, quam *spasmodicam deuteropathicam seu consensualem* appellare placet.

Et revera genitos fuisse ex omnibus, intestinorum tractum graviter afficientibus, irritamentis icteros, observata docent. Sic v. gr. a vomitoriis et purgantibus fortioribus drastrictis validos fieri in primis viis spasmodicos motus, nota res est. Hinc ex hac causa icteros quoque
nasci



nasci non infrequens est. Referunt nobis genitorum ex hoc fonte icterorum exempla cl. *van Swieten*, (p) *Iuncker*, (q) *Harris*, (r) *Riedlinus*, (s) plures. A deglutito fumo tabaci fortioris, nataque hinc gravi intestinorum irritatione, regium morbum productum memorat *Borellus* (t). A potibus aquosis ardentibus ingurgitatis auriginem creatam

N vidit

(p) Commentar. Tom. 3. p. 91.

(q) Consp. Med. Tab. 90, 5, 3, 6.

(r) Observ. de morbis aliquot gravioribus obs. 9. p. 20.

(s) Lin. Med. Ann. 5. mens. jun. obs. 20.

(t) Cent. 4. obs. 31.



vidit *Hoffmannus* (u). Ab abusu potuum spirituosorum morbum arcuatum provenisse, scribunt *Sylvius*, (v) *Riedlinus*, (w) *Hoechstetter*, (x) *Pechlinus* (y) &c. Notavitque idem in Comm. Norimberg. Ann 1735 hebd. 16 cl. *Stuart* nec non in diariis suis medicis cl. *Storchius* (z). A materia dysenterica, imprudenti consilio per adstringentia repressa iterum

(u) Patholog. gen. part. 2. cap. 4.

(v) Prax. Libr. 1. cap. 10.

(w) Loco jam citato.

(x) Decad. 10. cap. 6.

(y) Libr. 3. obs. 38.

(z) Achter Jahrgang 1730 M. Januar, pag. 344.



cterum in judæo observavit *Carlius* (a)
similisque habetur nati ex eadem causa
icteri historia in Actis Medicis Beroli-
nenfibus Decad. 1. vol. 9. p. 7. A ver-
mibus, intestina tam morfu, quam re-
ptatu suo irritantibus, hanc corporis de-
colorationem factam, in Observationibus
suis recenset *Platerus* Libr. 3. p. 883.
viditque ex eodem hoc fonte arquatam
morbum cl. *Hannes*. A meconio in in-
fantibus retento spasmos primarum via-
rum, et ex his icteros generari, rarum

N 2

non

(a) *Commerc. Norimb.* An. 1735 hebdom. 31.



non est. Conferri hic poterunt *de le Boe Sylvius* (b) celebrisque *Baglivius* (c). Et produci revera a materia hac acri, internas viscerum tunicas vellicante, ieterum, patet manifesto ex adhibenda huic morbo, ex hac causa nato, medela. Simulac enim per congrua remedia eductum meconium fuerit, sublataque sic irritatio, cessat extemplo morbus teste *Hoffmanno* (d), *Iunckero* (e), *Baglivio*, &c.

A

(b) *Libr. I. cap. 56. art. II. 4.*

(c) *Prax. Med. Libr. I. p. 83.*

(d) *Med. Rat. Syst. Tom 3. Sect. I, cap. 5.*

(e) *Consp. Medic. Tab. 90. I, 3.*



A succo uvarum immaturarum acerbo,
intemperantius ingesto, intestinis mole-
sto, morbum flavum progenitum narrat
Hoffmannus (f). A pomis immaturis come-
stis ictericam productam memorat
Rhodius (g). A nimio usu vini pomacei
natam cum colica pictonum auriginem
notat *Bonté* (h), genitque ex assumtis
immodice pyris icteri historiam com-
mercio literario Norimbergensi a. 1739

N. 3 hebdom.

(f) M. R. S. Tom. 4. part. pathol.
spec. cap. 12. obs. 8.

(g) Cent. 3. obs. 19.

(h) Journal de Medecine Tom. 15 M.
Dec. 2.



hebd. 39 inseruit cl. *Trew*. A venenis corpori ingestis similia prostant procreatorum icterorum exempla. Nec mirum; hæc enim oeconomiae animali inimicissima violentissimos per totum microcosmum cient spasmodicos affectus, horrendaque alia plura symptomata, licet ultrapylori limites nondum descenderint. A fructibus solani comestis arquatum morbum se observasse, in institutionibus suis physiologicis refert *Hallerus*. A fungo comesto, quem *Vaillant* foliaceis cum caule solido sine annulo annumerat, ictericiam



ictericiam vidit cl. *Monnier* (i); apertum-
que cadaver coarctatum quam maxime
choledochum ductum, constrictaque et
inflammata cum ventriculo intestina ex-
hibuit. Recensuit quoque inter dira illa
symptomata, ab esu chenopodii hybridi,
seu atriplicis sylvestris virosæ stramonii
folio producta, ictericiam corporis toti-
us colorem *Bernhardus Rust* in Differ-
tatione sua inaugurali Göttingæ habita-
de limitanda laude virtutis stypticæ bal-
sami vulnerarii rubri Dippelii et olei

N 4

martis

(i) Histoire de l' Acad. Roy. des sciences
An. 1749. art. 12. p. 210.



martis per deliquium. Varios insuper primarum viarum affectus spasmodicos generant suppressæ diversi generis hæmorrhagiæ, siue habituales hæ fuerint, siue naturales. Quinimo neglectæ quoque artificiales sanguinis ventilationes solitæ inordinatos hujusmodi sæpe numero excitant motus convulsivos. Spasmos ex sola plethora morbosa nasci posse, notissimis res est, quam quæ probationis indigeat. Argumenti loco cura illorum sit, quam sola venæ sectio præstat. Nati ex neglecta hac icteri casum memorat in ci-



tato jam sæpe Commercio liter. Norimb.
An. 1739 hebd. 4. p. 30 cl. *Kellner*.
A retardatis in juvencula tenera men-
sibus morbum nostrum genitum descri-
bit *Bartholinus* (k). A suppressis iisdem
eundem effectum vidit cum *Hoffmanno*
(l) *Trumphius* (m). In posteriori ca-
su cessavit illico post restitutum hunc
fluxum icterus. A retentis puerperarum
repurgamentis uterinis morbum hunc

N 5 subinde

(k) Centur. 5. hist. 62.

(l) M. R. S. Tom. 3. sect. 1. cap. 9.

(m) Commenc. lit. Norimb. A. 1740
hebd. 19. art. 3.



subinde nasci observavit *Forestus* (n),
Amatus Lusitanus (o) &c. A repentina
 hæmorrhoidum suppressione icteros et he-
 patidides non raro produci auctor est
Junckerus (p), citatusque jam aliquo-
 ties *Hoffmannus* (q); ejusdemque hujus
 morbi causas in excitatis nimis per alo-
 etica aliaque his similia medicamenta
 hæmorrhoidibus detexit in Comm. lit.
 Nor. a 1742 hebd. 26. no. 1. cl. *Wolff-*
fius

(n) Loc. sup. cit. obs. 21.

(o) Centur. I. Cur. 83. de morbo Regio.

(p) Loc. cit. Tr. de Jctero 5. 3, 2,
 it. Tab. II, 6, 10.

(q) Patholog. gener. part. I. cap. 6.
 § 38 & 39.

fus. Hæc quoque ratio esse videtur, cur in tractatu suo de curandis morbis *Listerus* hæmorrhoidariis ictericum colorem familiarem adserat tit. de hæmorrhoid. p. m. 32.

Transferri nonnunquam per metastasin materias morbosas ad intestinorum canalem, lugemus sæpenumero; lethalesque non raro emergentes inde videmus morbos. Ipse subinde icterus ex irritatis a materia tali primis viis progerminat. A materia erysipelacea epidemica ad intestina deposita frequentem illum



Ium infantibus fuisse memorat in Commerc. liter. Nor. An. 1740 hebd. 15. *Albrecht*. Nunquam autem in epidemia ista apparebat icterus, si leni laxante detergerentur post victum principalem morbum primæ digestionis viæ. A consolidatis malo consilio antiquis crurum ulceribus icterum *Lusitanus* vidit, nec non *Fabricius Hildanus* (r). A materia podagrica ad intestinale tubum per metastasin delata Regium nostrum morbum frequenter nasci docet *Junckerus* (s). Par
omni-

(r) Cent. I. observ. 60.

(s) Conspect. Med. 8, 19 p. 736.



omnino ratio est circa retrogressum ad abdominalia viscera materiam arthriticam. Spasmos inde partium affectarum eximios dolorificos sæpe lethales produci constat. Natos ex his icteros observavit in diariis suis medicis *Storchius* An. 1728 mens. mai. Conferri hic meretur *Listeri* tract. de morb. chron. tit. de Arthritide p. 88. seq., neque minus digna est, quæ legatur observatio illa, quam cl. *Lazzari* exhibuit (t), foeminae ejusdem, podagra nodosa jam a longo tempore labo-

(t) *Historiæ binæ rariores Venetiis 1761* descriptæ p. 17.



laborantis, quæ post prægressam, a re-
vocata ad abdominalia viscera sine du-
bio materia peccante, acri, colicam gra-
vissimam, in icterum incidit, perquam
pertinacem. Omnibus his jungi poterunt
illa, quæ in observationibus suis circa
morbos castrenses cl. *Pringle* memorat
cap. de inflam. ventr. et intest.; nec
non rarus ille casus, quem cl. *Pye* de-
scribit, solutæ per sudores criticos icte-
ricos podagræ pessimæ (u). A febre in-
termittente suppressa, icterum, cystidis-
que

(u) Medical observations and inquiries
vol. I. art. 6.



que fellææ ulcus genitum refert in trans-
actionibus philosophicis anglic. *Amyan-*
dus. Vidit natum ex simili causa flavum
morbum *Ramazzini*; firmantque hæc o-
mnia observatis suis *Storchi*us (v), *Fore-*
stus, (w) *Hoffmannus*, (x) *Baumli-*
nus, (y) alii. In posteriori hoc, a cl.
Baumlino relato, casu natus a suppressa
intermittente tertiana febre icterus; re-
stituta hac, sponte sanabatur.

Spa-

(v) Siebender Jahrgang 1729. Mon.
Julius.

(w) Loc. sup. cit. obs. 23.

(x) M. R. S. Tom. 3. sect. I. cap.
9. § 26. p. 231.

(y) Comm. liter. Norimb. a 1738, hebdom.
5. art. 2



Spasmos ventriculi totiusque intestinalis tubi exquisitissimos ab admoto corpori externo, præsertim æstuanti, subito frigore produci, nemini non notum est. Quid ergo mirum, si de icteris quoque ex hoc causarum fonte genitis præstent exempla. Observavit icterum ab incauto et subitaneo corporis refrigerio *Ridley* (2). A natatione, sudante adhuc corpore perperam celebrata, eundem hunc arquatam morbum nasci vidit *Swie-*

tenus

(2) Observat. medic. et physiolog. 24
p. 100.



zenius (a). Ab immersione subitanea pedum in aquam gelidam icterum profectum notant *Miscellanea Naturæ Curiosorum* (b). Non inferiorem aut promtorem minus effectum producent ingesti protinus æstuanti corpori potus gelidi. Inter plures periculosæ aleæ plenos ex hoc delicto provenientes morbos icterum expertus recenset *Junckerus* (c) allegatusque jam supra cl. *Trew* (d).

O Vidimus

(a) Comment. ad Aph. Boerh. 916.
Tom. 3. p. 90.

(b) Dec. 3. ann. 1. obs. 86.

(c) Consp. Med. Tab. 90, 5. 7. p. 710.

(d) *Commerc. lit.* Nor. an. 1739 hebd. 39.



Vidimus jam in antecedentibus, singularem admodum esse venenorum corpori animali ingestorum naturam, illam nempe, ut primos et truculentos maxime in totum intestinale tractum, omneque systema nerveum exserant effectus, licet ultra ventriculi limites non pertigerint: sed mirandum profecto magis est illud; quod cuicumque vel extremae corporis parti applicata, statim in ventriculum intestinorumque canalem defaviant, ibi primario deleteriam suam vim commonstrent, fideque citius

hic,

hic irritationes gravissimas, inflammations, convulsiones, gangrænas producant. Inter symptomata illa, quæ a primis, ab hac causa natis, primarum viarum spasmis produci observantur, icterus quoque noster se sistit; non, ut a quibusdam credi voluit, a solutione generali humorum putrida proficiscens, sed vere spasmodicus, consensualis. Sic a viperæ veneno, per animalis hujus morsum corpori insinuato, totum corpus foeda aurigine tingi memorant Ho-



lenius, (e) Sylvius, (f) Shaw, (g) Bonetus, (h) Galenus, (i) Coelius Rhodigius, (k) multique præter hos alii. A bufonum veneno hac ratione corpori communicato aurigines fieri memorat in tractatu suo de venenis cl. *Allen* art. 59. cap. 16 p. 573. A tarantulæ ictu icterum interdum nasci ex *Georgii Christoph. Petri* tract. de card. bened narrat *Schurig* :

(e) Dissert. inaug. de ictero p. 9.

(f) Loc. cit. Art. 40. p. 303.

(g) Prax. med. libr. 1. cap. 13. p. 305.

(h) Sepulchr. anat. libr. 3. sect. 18. obs. 1.

(i) Libr. de loc. affect. L. 5. cap. 8. Charter Tom. 7. p. 498.

(k) Antiq. Lect. Libr. 6. cap. 13. p. 204.

Schurig (1). Sequi ictericiam inflictam corpori a scorpione vulnera docet *Marcellus Donatus* (m); fidamque illam esse aspidis ictuum fociam, notat in Dissertatione sua inaugurali de cachexia icterica *Henneke*. Jungi his ea poterunt, quæ circa hanc regii morbi causam *Baglivius* Libr. I. de ictero p. 85 refert.

Alibi demonstravi, quæ et quanta ex moribus animalium irritatorum, iracundorum nobis imminent et fontica peri-

O 3

cula

(1) Tractat. de saliva cap. 5. de ictu tarant. p. 205.

(m) Histor. med. mirab. libr. I. cap. 9. p. 74.



cula. Vere venenati hi sunt. Rabiem non raro producant, symptomataque creant, istis a veneno assumpto vix minora, ipsum icterum. Sic a morfu sciuri regium productum morbum referunt *Naturæ Curiosorum Acta*. A felis domesticæ iratissimæ morfu ictero valde perstinaci correptum hominem refert *Lanzoni* (n), qui et arquatum hunc morbum a morfu canis natum vidit. Sufficiant hæc. Festinabimus ad alias icteri spasmodici consensualis causas. Comi-

tem

(n) *Act. Phys. Med. Tom. I. obs. 96*



tem sese icterus sæpenumero jungit aliis abdominalibus spasmodicis morbis. Ab hernia incarcerata inguinali, nataque hinc spasmodica intestinorum stricture, icterum ejusdem hujus naturæ descripsit in *Commerc. Lit. Norimb. A. 1742 hebdom. 26. no. 1. cl. Cobausen*. Secuit hic hominis hujus, ab hoc morbo, ex chirurgorum imperitiâ, qui herniotomiam tentare non audebant, defuncti cadaver; nullumque vel minimum invenit hepatitis, vel cystidis felleæ vel ductus cholechochi organicum vitium. Spastica quip-



pe partium stricture *interdum* a morte sol-
vitur, si mediocris fuerit, et recens; sin-
vero major morbus, et actuosior causa, si
constrictio firmior fuerit, et duraverit diu-
tius, constrictæ quoque post mortem ma-
nent affectæ partes. Aliam icteri causam
non raro suppeditant spasmodicæ illæ hy-
pochondriacorum et hysteriarum affecti-
ones. Supervenientem his morbis icterum
memorant *Holenius*, (o) *Listerus*, (p)

Stor-

(o) Loc. jam citat. pag. II.

(p) Proceſſ. integr. in morb. cur.
Sect. de colic. hyſt. p. 29.



*Storchi*us, (q) *Wolff*ius, (r) *Syden-*
*ham*us, (s) *Morton*us, (t) *Fore*stus,
(u) alii, qui posterior productum ex
hac causa icterum solis clysteribus e-
mollientibus injectis sanavit. A car-
dialgia progenitarum auriginum exempla
memoriæ prodiderunt *Hoffmann*us (v),

O 5

Iuncke-

(q) Vierter Jahrgang Mon. Dec.
1726. Siebender Jahrgang 1729. p.
278. Achter Jahrgang 1730. April.
p. 449.

(r) Com. Lit. Nor. A. 1742. Hebd.
26. no. 1.

(s) Opera Sect. 4. cap. 7. p. 213.

(t) Libr. 3 cap. 13. hist. 2.

(u) Libr 19. obs. 17.

(v) Medicina rationalis systematica.
Tom. 4. sect. 2. cap. 2. obs. 3.



Junckerus, (w) *Pringle*, (x) *von Stein*,
 (y) citatusque modo *Forestus*. Similem
 a doloribus cardialgicis excitati icteri ca-
 sum recenset in *Commerc. Lit. Nor. A.*
 1739 hebd. 39 cl. *Trem.* Produxerat
 hic cardialgiam ingestus corpori æstuan-
 ti potus gelidus; subsequēbatur lento
 gradu icterus. Sanabatur per camphoram
 in oleo amygdalino solutam et oleum
 cajeputi. Redibat mox a comestis intem-
 perantius pyris. Profligebatur denuo per
 anti-

(w) *Consp. Med. loc. jam. cit.*

(x) *Beobachtungen über die Krankhei-
 ten einer Armee Th. 3. cap. 4. Absch. I.*

(y) *Dissertat. inaug. de cardialgia*



antispasmodica. Aliam in iisdem his *Actis Noricis*, A. 1739 hebd. 44 natæ a cardialgia fodaque vehementi auriginis historiam tradit *Bruckmann*. Varia exhibita fuerant ad compescendos, qui intolerabiles erant, dolores, spiritus calidi; propinata fuerant a medico quodam emetica, cum insigni tam dolorum quam regii hujus morbi augmento; cessit autem brevi, exhibitis larga manu medicamentis antispasmodicis resolventibus, uterque morbus. Doloribus præterea colicis, præsertim si atrociores fuerint, diuti.



diutiusque perseverent, facile adsociatur
 arquatus morbus. Consignarunt hujus
 phanomeni exempla *Sydenhamus*, (z)
Storchi, (a) *Hoffmannus* (b) &c.,
 traditque nati ex hoc capite icteri peri-
 odici historiam cl. *Johnstone* (c). Quin
 inter symptomata illa, quæ colicam pi-
 ctaviensem concomitantur, nostrum quo-
 que

(z) Oper. sect. 2. cap. 7. p. 216.

(a) Dritter Jahrg. p. 828. vierter
 Jahrg. dec. 1726. p. 628. fünfter
 Jahrg. Sept. 1727. p. 213. it. 1728.
 Nov. p. 745. Siebender Jahrg. Apr.
 1729.

(b) M. R. S. Tom. 4. part. pathol.
 spec. cap. 12. obs. I p. 370 seq.

(c) Philosophical transactions vol. 50.
 part. 2. for the year 1758. p. 543. seq.



que morbum experientia duce recensent
cl. *Bonté* (d) et *Haenius* (e), qui in
sectis post mortem cadaveribus constri-
cta chordaplo vero intestina, rapinque
in hujus affectionis consensum systema bi-
liarium demonstravit.

Idem omnino obtinuit in nostro, cu-
jus historiam in fronte hujus opellæ
jam dedi, epidemico morbo. Apparebat
et hic post vehementissimos dolores co-

licos

(d) Journal de Medecine tom 15. M.
nov. 2. it. tom. 16. mois apr. 1762
p. 300.

(e) Meth. med. tom. 10. cap. I. p.
17, 55, 68, 101.



licos spasmodicos a tussi convulsiva excitatos. Tussim vero ipsam hanc inanem, spasmodicam, a prava primarum viarum constitutione nasci sedemque suam principalem fixam ibidem habere experientia docuit felixque huic morbo medendi methodus.

Transeunt, uti supra jam notavimus, ex partibus vicinis affectiones morbosæ in primas vias. Desinunt sæpe sæpius in colicam spasmodicam dolores nephritici, vel calculosi vesicæ urinariæ, teste *Langio*, Epist. 45, productusque per intestina.



stinalem tubum ad biliaras usque vias
spasmus icterum creat. Historia genitæ
sic a nephritide calculosa auriginis legi-
tur apud *Hoffmannum* (f), paremque
casum exhibet *Mortonus* (g) absque
quod ipsi vel minima nata fuerit de spa-
smo hic præsentis suspicio. Quantas per
totum corpus excitare turbas possint
vehementiores animi affectus, quamque
cito operentur cuilibet notum est. Ni-
ctu oculi citius timor pallorem, pudor
ruborem

(f) M. R. S. Tom. 4. sect. 2. cap.
6 obs. 1.

(g) Oper. med. libr. 3. cap. 13 hist.
2. p. 137.



ruborem genis conciliat. Maxima tamen et prima harum animi emotionum violentiorum vis in ventriculum defævit, ejusque viciniam. Epigastrium locus ille est, in quo ad quemlibet excitatum animi affectum graviolem, iram, terrorem, indignationem, pavorem, tristitiam, gaudium, libidinem &c. ingratum quendam sentimus stimulum (h). Nauseant animo commoti, (i) præpeditur deglutitio et constringitur sensibilibiter oeso.

(h) Kaauw libr. impet. fac. Hipp. § 384. p. 280.

(i) Comment. in aphor. Boerh. 642. n. 5. tom. 2. p. 222.



oesophagus (k). Patet ergo manifeste, adeo rara non esse productorum ab hac causa ictorum exempla, Validas in organis bilis secretoriis et excretoriis turbas excitare iram, notissima res est. Hinc ad ictum generandum nihil ira aptius vel potentius afferit *Hoffmannus* (1). Spasmos, epilepsias, anomalosque systematis nervosi motus ex brevi hoc furore nasci videmus quotidie, nimisque familiares sunt vomitus, diarrhoeæque bi-

P

liosæ

(k) Hoffmann oper. tom. 3. § 16. p. 132.

(1) M. R. S. tom. 4 part. pathol. spec cap. 12. § 8. p. 355.



liosæ et colicæ atrocissimæ ab hac causa, quam quod ad aliorum in hac re observata provocare necessum sit. Aurigum tamen, ab ira graviori productarum, hic aliquot exempla in medium proferre expedit. Vidit illam ex summa animi excandescencia in muliere quadragenaria, cum alvi constipationibus, tensionibusque validissimis hypochondrii prodeuntem, *Albrecht* (m). Similem in diariis suis medicis casum descripsit *Storck*

chini

(m) *Commerc. lit. Nor. A.* 1736 hebd. 44. art. I.



chius (n). Sistit nati ex hoc animi affectu icteri pertinacis historiam in Dissertatione sua de ictero *Hartemannus*, idemque observatis suis confirmat *Hoffmannus* (o), redditque hujus phænomeni rationem in pathologia sua generali tom. 2. cap. 1. § 16. in scholio. Fieri, dicit, in hoc casu icterum a constrictione spastica ductuum biliariorum. Gravidam ab ira ictericam factam, communicatumque ipsi foetui hunc morbum re-

P 2 fert

(n) Vierter medicinischer Jahrg. m. may 1726. p. 248.

(o) Oper. tom. 3. sect. 1. cap. 5.



fert *Bierling* (p) aliaque infantum sic cum ictericia natorum exempla perhibuerunt *Dolacus*, (q) *Panarolus* (r) et *Schultzius* (*) videruntque ex observatoribus recentioribus cl. *Sandifort*, *Hannes* alique in neonatis infantibus icterum. Perrarus fane est ille, quem in specilegio suo anatomico obs. 57 *Kerkringius* tradit, casus pueri, a matre icterica nati, cujus ipsa ossa saturatissima flavedine tincta observabantur. Nec mi-

nus

(p) *Adversaria medica*. 1076.

(q) *Libr.* 3. cap. 8.

(r) *Pentecost.* 4. obs.

(*) *E. N. C.* Dec. 1. ann 7. obs. 241.



nus memorabile embryonis icterici trimestris per abortum a foemina icterica exclusi exemplum cl. *Wriesberg* exhibuit, cum anatomica subjecti descriptione. Abierunt in varias sententias varii, quibus phenomenon hoc videre obtigit, auctores medici. Colligere autem diversas illorum circa hanc rem opiniones vetat instituti hujus ratio. Natos in adductis modo casibus icteros censemus simpliciter a communicatione humorum maternorum morboforum, bile flava praeter naturam intime mixtorum, in ali-



mentum et augmentum foetus impensorum. Mirum profecto non est videre sic in infantibus morbos a corruptis succis maternis nasci, morbo matris pares; sed hæreditario quodam jure transire a parentibus ad liberos familiarem quandam huic vel illæ familiæ morbum, idque non a prima nativitate, sed certademum ætate, hoc notatu dignissimum est. De phthisi, epilepsia, podagra, lithiasi, &c. notum proh dolor! est, transferri affectiones has a parentibus ad filios interdum nepotes. De ictero autem rariores



variores sunt huius commatis casus. Vidit tamen simile quid cl. *Boerhaavius*. Familiam quandam magnus hic vir novit, in qua omnes certo ætatis termino fiebant icterici tandemque nullis remediis cedente malo, ab hepate scirrholo peribant hydropici. Exhibuit observationem hanc ex ore præceptoris sui cl. *van Swieten* in comment. ad aphor 486. Lactentem infantem ab iracundia matris ictericum factum narrat in *Ephemeridibus Naturæ Curiosorum Verdvies*.

Non minus fertilis icterorum causa

terror



terror est, cujus præsentaneos et fatales sæpe in viscera abdominalia effectus quotidiana docet experientia. Regii nostri morbi ab hoc animi affectu nati exemplum cl. *Boerhaave* in scriptis suis exhibet. Meminit mercatoris, qui de facto navis suæ onerariæ naufragio certior factus et præter modum subito conterritus in arquatium morbum confectum incidit, qui brevi post periodicus factus, hepatis scirrhum, agro mortem intulit. Confer hic, quæ in commentariis suis ad *Boerhaavii* apriorismos cl. *Swietenius* Tom.



3. p. 91 refert, quæ denique in Dissertatione
sua inaugurali de terrore scripta § 23
Leonh. Stocke circa hanc materiam ube-
rius tradidit. Notavit similem omni-
no casum genitæ a valida animi pertur-
batione auriginis *Valsalva*. Citat hunc,
et aliam simul non minoris ponderis
historiam addit cl. *Morgagni* in Epist.
anatom. med. 38. art. 2. Casus hic est:
Juyeni cuidam peringenioso, sacris et
literis addicto truculentus quidam et
horribilis vir sclopetum non opinanti
ad pectus intentat. Quo ille terrore per-



culus ipso hoc momento ictericus fit, brevique post delirus intra 24 horarum spatium convulsus obiit. In utroque casu nec *Valsalva* nec *Morgagni* in secto cadavere vel minimum morbi alicujus ictero generando apti vestigium detexerunt; hinc et uterque ex constrictione partium convulsiva ab animi affectu producta natum hic icterum et merito quidem, censet. Arcuati morbi a tristitia nati historiam in Dissertatione inaug. de animi affectibus § 78. p. 46. exhibuit *Valkenaer*; ubi lato convivio ad-

fidens



fidens vir hilaris, alacris, sanissimus,
per acceptum tristem nuntium adeo af-
fligitur, ut antequam ex convivio dis-
cederet, ictericus esset. Addit relationi
huic auctor phænomeni hujus rationem
„non crediderim, inquit, investigandam es-
„se in materia modo memorata (atrabilaria
„nempe, de qua in hoc paragrapho fer-
„mo fuerat) sed potius in spasmo, qui
„ductus biliosos occupavit,,. Idem hoc
aliis exemplis confirmat *Ettmüllerus*.
Anxiæ præterea animi sollicitudines ex
eiusdem auctoris sententia flavum hunc
mor-



morbum sæpe sæpius produciunt. Ob-
servavit hoc jam *Helmontius*, (s) sistit-
que productæ sic a moerore gravi icte-
ricæ historiam in consultatoinibus suis
Hoffmannus. (t) Neque immerito huc
referri poterit sacrarum paginarum lo-
cus ille *Ieremie* 30. v. 6. collatus cum
Deuteronom. 28 v. 22, ubi ieterum, ab
animo propter imminentes coelitus præ-
dictas divinas clades summis sollicitudi-
nibus circumacto eventurum Israelitis

Jehova

(s) Tract. de sede animæ seu jure diuini-
viratus p. 564.

(t) Tom. 2. lect. 3. cas. 57. p. 264.
seq.



Jehova prædicit. Versio quidem germanica patrium huic morbo proprium nomen *Gelbsucht* non ubique habet sed terminis *Misfarbigt*, *Bleichsucht* &c. in locis his utitur. Vocula autem hebræa, quæ hic occurrit: *Ierakon* ex unanimi interpretum optimorum, *Clerici*, *Buxtorfii*, *Scheuchzeri*, *Schindleri*, *Junii*, ipsorumque Rabinorum sententia per icterum summo jure vertitur. Hinc et per septuaginta sacri codicis interpretes grecos *Ierem.* 30 per *ικτερος*; *Deuteronom.* 28 vero per *ω χροον*, quod colorem vitelli-



tellinum, quasi *ω8 χρῶαν* diceret, translata est (u). Alia insuper nati a

moerore

(u) Proprie vocula hæc hebræa (quamquam pro colore croceo vel aureo subinde sumatur, uti ps. 68. v. 14) ob natales suas, quas a radice *Iarak*, *Iarok*, et *Iaerek* ducit, quæ herbam significat, colorem indicabit herbaceum viridescentem; vel potius, si cum textu, Amos 4. v. 9. comparetur, colorem notabit herbæ marcidæ emorientis, quem galli *feuille morte* appellant. Hinc et divus artis nostræ fundator *Hippocrates*, dum in libro suo *περι νῆσων* Libro 2. et 3. ictericorum oculos, habitum, urinas, salivam &c. describit, colorem illis dat *χλωρον*, quæ vox pari modo a vocula *χλωα*, quæ herbam indicat, proficiscens, colorem ictericorum ex viridi et bruno flavescentem designabit.



mœrore morbi regii exempla confignavit *Sylvius de le Boe* (v) et *Bonetus* (w). Tanta est animi affectuum in producenda aurigine vis.

Dubitare autem quis forte posset, an revera hæ animi perturbationes, dum icterum producunt, effectum hunc per veras, quas in primis viis systemateque bilioso generant strictureas spasticas creent, vel alio quodam modo? Resp. Nul- lum omnino superest dubium, post captas tot circa hanc rem observationes

nasci

(v) *Libr. 1. cap. 66, 9.*

(w) *Sepulchr, Libr. 3. sect. 18. obs. 2.*



nasci reapse ex productis per animi affectus spasmis sic iterum. *Hoffmannum* testor (x) et *Fernelium* (y), qui ambo, validissimas ab animi affectibus in ventriculo, diaphragmate, jecinore, ductibusque biliaryis excitari strictureas spasmodicas experti asserunt. Ne autem horum virorum auctoritati nimium in hac re largiri videamur; nonnullos hic recensere animi affectuum in primas vias effectus, manifesto spasmodicos. Vo-

mere

(x) M. R. S. Tom. 4. sect. 2. cap.
2. § 13.

(y) Libr. 4. de Febr. cap. 10.



mere videmus homines delicatiores ab audita re nauseosa (z); nauseare alios a sola recordatione medicamenti vel alius rei nauseosa. Singultiunt nonnunquam summe conterriti (a) teste *Hoffmanno* (b), rejiciuntque vomitu bilem acrem causticam ira graviori excandescentes. Hernias non raro lethales ab animi affectu violento viscerumque abdominalium convulsiones produci, observatis pariter constat. Dignus certe, qui hic no-

Q

tetur

(z) *Helmont. loc. cit. p. 564.*

(a) *Leonh. Stocke. l. c. §. 20. it. Disfert. nostr. de singultu.*

(b) *Oper. Tom. 5. §. 18 §. 261.*



tetur, casus ille est, quem celebris quondam Amstelodamensium medicus, circa artem anatomicam meritissimus, *Ruysebius* in observationibus suis anatomico-chirurgicis centur. I observ. 98. p. 91 narrat. Potens quidam amstelodamensis neonopola, quum in cella sua crepans de improvviso vini dolium praesens videret, illico in bubonocelen incidit lethalem. Notat simul *Ruysebius*, comperisse se tunc a chirurgo ejusdem urbis, in sanandis herniis exercitatissimo, rarum nullo modo esse quod a terrore herniae nascantur. Incar

cerari



cerari a subitaneis animi affectibus hernias et subito fatales fieri, confirmant observationibus suis *Medici Vratislavienses* an. 1707, illustrisque *Hoffmannus*. Uteri prolapsum ex terrore protinus fanatum, retractis in sua loca elapsis partibus, ferunt *Les Anecdotes de Médecine* p. 72. Volvulos denique, ipsosque chordaptos ex animi affectibus productos refert *Tulpius* (c); pluresque deduci ex eadem hac causa atrocis huius mali geneses in observationibus circa i-

Q 2 lei

(c) Libr. 2. obs. 41.



lei morbi naturam et causas Academiæ
N. C. communicatis.

Certum itaque est, argumentisque factis validis numerosaque experientia probatum, dari omnino icterum spasmodicum, nulli alio vel hepatis vel bilis, vel viscerum aliorum, cholopoiesi coinservientium labi origines suas debentem, sed ex sola cystidis felleæ, ductuumque biliariorum constrictione spasmodica, vel idiopathica, vel consensuali genitum. Restat ergo, ut inquiremus, an icterus ille, cujus historiam in tra-

etavili



etatuli hujus initio dedimus, spasmodicus talis revera fuerit?

Morbos nosse, eosque probe inter se distinguere, ardua profecto res est. Effugit sæpe sub intricatissima symptomatum farragine omnem sensuum nostrorum aciem verus morbi genius, ludique non raro oculatissimum quoque et diligentissimum observatorem. Non tamen minor requiritur rerum peritia ingeniique acumen ad eruendas cogniti jam morbi absconditas, altisque tenebris obvolutas sæpe, causas; quarum tamen



cognitio unica est ad felicem morborum curationem via. Nascitur idem sæpe morbus ex diversissimis, quin oppositis nonnunquam sibi e diametro causis. Has qui detexit, prognosin ferre firmam, et sanationem, si qua detur, felicem polliceri solus poterit. Hoc iudicium illud difficile est, de quo primus *Hippocratis* aphorismus. Exemplo icterus noster esto. Ipsum morbum dignoscere ab omni alio facile poterit ille, qui semel tantum, quoad vixit, ictericum vidit. Causam vero, unde natus fuerit,

causæ



causaeque causas eruere; hoc opus, hic labor est. Vidimus in antecedentibus, nasci arquatum morbum a variis hepatis morbis, ab ejus inflammatione, abscessu, scirrho, infarctu; nasci eundem a compluribus vesicæ felleæ affectionibus morbos, phlegmone, hydrope, occallescentia, ulcere, &c., a varia ductuum biliariorum constitutione præternaturali, spasmō, obstructione, inflammatione, infarctu, induratione, a calculis cysticis, a verminibus hepaticis, cysticis, et intestinalibus; a defiguratione morbosa partium canali-



bus biliferis vicinarum. Vidimus bilem ipsam tam quantitate quam qualitate peccantem auriginem producere. Et quot ad bilem efformandam concurrunt abdominalia viscera! hepar, splen, pancreas, omentum, intestina ipsa, omnia sana sint oportet, si laudabile a sanguine sequestrari debeat fel. Generari porro diximus icterum a diversis partium nervosarum, licet dissitissimarum, affectionibus dolorificis, a tendinum læsionibus, vulneribus capitis, morfibus animalium, vel iratorum vel rabiosorum, a

venenis

venenis assumtis, a spasmodicis ventriculi et
intestinorum per multiplices suas causas
productis, ab animi affectibus, a sup-
pressis evacuationibus, vel naturalibus
in statu sano, vel artificialibus, aut cri-
ticis in morbofo statu. Quanta ergo
unici hujus morbi causarum grex! quan-
taque cautione opus est ad detegendam
unam illam, quæ morbum præsen-
tem producit, causam! En, ex qui-
bus signis spasmodicum hunc judicave-
rim morbum! *Primum*, quod de vera
hac morbi nostri causa suspicionem mo-



vebat, genesis erat hujus icteri ex morbo similiter spasmodico, tussi nempe convulsiva, quam in ventriculo et primis viis sedem suam habere non solum ex unanimi auctorum, qui hoc morbi genus ex professo tractaverunt, *Dolai*, *Hoffmanni*, *Waldschmidii*, *Rosensteinii*, *Lindani*, *Bourdelini*, *Zanders*, aliorumque observatione sciebam; sed ex propria quoque experientia tempore epidemiae nostrae, a me descriptae, facta didiceram. Hinc sobolem a matre non degenerem, morbumque spasmodicum a spasmodi-

modico facile natum argumentabar; præfertim, quum similem a tussi convulsiva productum icterum Vesalia observatum a se meminisset in Tractatu epistolari ad ill. *Baierum* de insitione variolarum dato cl. *Hannes* p. 85. Alterum, quod spasmus icteri nostri causam arguebat, erat conjunctus immediate cum præsentis morbo affectus alius spasmodicus, dolores nempe colici atrocissimi, adeo vehementes, ut de possibili non solum, sed de facto revera transitu hujus spasmi in loca vicina nulla superesse potuerit dubitatio;



bitatio; præprimis, cum *Tertio* propagationem hujus spasmi in altiora quoque loca, septum transversum, pulmones, laryngem, visceraque vitalia, interclusus derepente spiritus subitaneaque non nunquam inde proveniens, mors manifesto doceret. *Quarto* ipse cum ictero nostro conjunctus colicus dolor, ab adultioribus ut aperte convulsivus seu constrictorius accusatus, ab acri et mordente illo, quem effusa in tractum intestinalis bilis morbosa producere solet, a lacerante et scindente illo, qui a calculis



calculis cysticis exitum tentantibus nascitur, nec non ab urente, tensivo pulsante, inflammatorio, et profundo obtuso gravativo illo dolore, qui affectum diversimode hepar notat, maxime distinctus, spasmus hujus scenæ matrem indicabat. *Quinto* dolorum, cum ictero nostro conjunctorum, locus, sola intestina cum ventriculo eorumque viciniam proximam successive affici notabat, dum ab inferioribus sensim altius adscenderet, locaque potissimum anteriora abdominis regionemque umbilicalem et epigastricam



cam occuparet morbus; quum contra-
 nascens ab hepate inflammato, vel a
 calculis cysticis, biliares ductus irritanti-
 bus, dolor scindens, iniquissimus a late-
 re dextro magis ad dorsum, scapulas,
 claviculas et jugulum propagetur. Ob-
 servatio hæc nova non est. Habet illam *Ave-*
tæus Cappadox libr. de diuturn. morb. I,
13. item Cæl. Aurelianus Tard. Pass. 3,
4. nec non Ballonius Libr. I. Cons. 75.
p. 407. Proprie autem, quoad dolores
ex affecto diversimode hepate nascentes,
eorumque in partes vicinas diffusionem,

notasse



notasse refert; differri condolentia loca, prout diversa fuerit affecta hepatis regio, dum vel in parte gibba superiori, vel in inferiori concava, in ipsa substantia, vel in membranis vestientibus, in proprio parenchymate, vel in systemate biliario, in vicinia ligamentorum suspensoriorum, vel in loco ab his remoto ægrotaverit. Horum autem omnium elucidatio, quum ex distributione nervorum, continuatione membranarum, &c, per anatomen noscenda, haud difficulter extricari possit; nimis autem pro-



lixa foret, quam quæ opusculo huic succincto inferi valeat, hic merito omit- titur. *Sexto*, ingruens subito icterus, abs- que ullo alio vitiati hepatis vel alius vi- sceris cholopoietici manifesto signo ex- læsis functionibus prægressis facile co- gnoscendo, causam hic præcipitem, cito- natam, qualem præter spasmus ceteris- paribus in subjectis nostri morbi ut plu- rimum infantilibus aliam vix suspicari lice- bat, arguens novum adjiciebat sententiæ adoptatæ pondus; maxime, cum *Septimo* æque subito rursus post solutum paroxy-
finum



finum spasmodicum icterus quoque sol-
veretur, rediretque brevi roseis ori co-
lor. Ambulatoria hæc morbi natura, am-
bulatoriam quoque et vagam ejus accu-
sabat causam, qua vel cito oboriente vel
cessante, apparebat aut evanescebat rur-
sum icterus. *Octavo* alvi excrementa,
quæ dura, rotunda, globulosa, scybalis
caprinis similia in morbo nostro fuisse
diximus, indubitatum spasmodum inte-
stinalium exhibebant signum. Hæc enim
alvinarum egestionum præternaturalis
configuratio, *cl. Haenio* teste, non nisi



convulsivam ductus intestinalis constrictionem agnoscit matrem. Invenit nempe illustris hic vir in cadavere hominis mortui ex colica pictonum, quam convulsivam communis fert medicorum sententia, ubi eadem omnino excernuntur duræ et globosæ faeces, intestinum ileum alternatim adeo constrictum, ut a circumjecto filo subligatum credidisses. Vid. *Haenii Method. med. tom. 10. cap. 1 de Colica Pictonum* pag. 9. 17. 28. 55. 68. 94. 101. seq. Idem omnino observaverunt in colica saturnina convulsiva,



vulsiva, quam *Hüttenkatze* Germani appellamus, clarissimi viri *Ilseman*, *Stockhausen*, *Zimmermann*. Nono non minus certam spasmodici hujus morbi notam dedit, eruptionem icteri proxime antecedens, totius corporis rigor. Hic enim, ut infra fusius docebimus, spasmodorum interiorum communis et certus index est. Conf. *Hoffmannum* in Oper. Tom. 3. sect. 1. cap. 5. divumque *Corn* in aphor. sect. 4. aph. 46, 58, 63. Decimo stricturearum internarum spasmodicarum, natiq̃ue in substrato casu ex his regii



nostri morbi indicium æque manifestum præbuit urina stranguriosa, tenuis, æquosa, limpida, ictero huic familiaris. Notavit suo jam tempore symptoma hoc reverendus senex, in prænot. coac, secundum *Dureti* ordinem 44, 48, 55. it. T. 5. Libr. 1, 26. Monet similiter, tenuissimas excerni in colicis illis, quæ a spasmò excitantur, urinas, *Hoffmannus* Tom. 4. sect. 2. cap. 2. obs. 1. p. 341. parilemque observationem circa urinas tenues et aquosas in morbis spasmodicis hypochondriacis & hysteriis ubique ob-



vias exhibuit in commentariis ad aphorismos *Boerhaavianos* tom. 3. aph. 916. p. 92. cl. *Swietenius*, nec non *Sydenhamus* in Dissert. epistol. ad cl. *Cole* scripta de affectione hysterica. Vid. Oper. p. 392, 394, 398, edit. Leid. 1726. Quibus omnibus merito adjungi poterunt illa, quæ de difficultatibus urinæ a morbis viscerum abdominalium spasmodicis oriundis consignavit *Iunckerus* in consp. med. tab. 78, 4, 2, b. it. *Hippocrates* in Prænot. Libr. 1, 29. nec non Epidem. Libr. 6. sect. 1, 9, & 10.



Undecimum icteri nostri a spasmo partium nati indubitatum signum dedit ipsa morbi solutio cum signis manifestis soluti spasmi, tam interni, quam peripherici, videlicet sudore profuso, spontaneaue tam alvi quam urinæ solutione conjuncta. Conf. hic aphorismum *Hippocratis* 44. sect. 6. Tandem ultimo loco medendi quoque methodus, ipseque remediorum huic ictero adhibitorum impar successus latum de causa nostri morbi primaria judicium plenarie comprobabat; dum omnia illa, quæ sub re-

solven-



Solventium, aperientium, vel evacuantium titulo nota medicamenta sunt, omnia, quæ bilem spissiore fundere obstructaque ejus vasa recludere novimus, ipsaque vel tantillum moventia clysmata, verbo, cuncta illa quæ aliis, ex alia causa natis, icteri diversis speciebus medicari solent remedia, non solum sperato caruerint effectui, sed morbum, insuper auxerint magis; dum contra emollientissima quævis, solvendisque spasms idonea medicamenta cefferint ex voto, totamque absolverint hujus morbi curam.



Hæc potissimum signa illa sunt, quibus ad diagnosin hujus morbi, ejusque causarum, usus fui. Credere in genere libet, spasmodicos hos maxime renunciandos icteros esse 1. qui periodici sunt regulares, Simpliciter enim intermittentes, aut data quadam occasione recurrentes, hujus ordinis non sunt. Hi, uti mox erimus visuri, aliis quoque causis natales suas debent. 2. Spasmodicos illos censeo icteros, qui a morbis intestinorum vel ventriculi spasmodicis nascuntur, recentes. 3. Pro spasmodicis habent.



di illi sunt, qui absque ullo prægresso læforum viscerum cholopoieticorum læbe subito fiunt et absque manifesta causa brevi iterum cessant. 4. Huc referendæ erunt omnes illæ auriginum species, quæ ab animi affectibus, aliisque generis nervosi irritationibus vel læsionibus producuntur. 5. Spasmodicis adnumerandi illi icteri sunt, qui febribus intermittentibus nubunt, vel febrium intermittentium personam agunt. 6. Hujus classis quoque illa sunt morborum arquatorum genera, quæ febribus acutis tempore in-



stantis criseos, cum rigore corporis, &c.
accedunt.

Sufficiant hæc ad determinandam i-
cteri nostri causam; spasmum. Restat,
ut et hujus quoque probabilem causam,
quantum licet, ex suis fontibus hic bre-
viter eruamus.

Prægressus fuerat biliosus putridissimus;
morbus, vix non totam humorum mas-
sam funditus corrumpens, manifestamque:
succorum acrimoniam, systemati nervo-
so, præcipue telis nerveis ventriculi,
septi transversi, pleuræ, ipsisque pulmo-
nibus



nibus et bronchiis gravem, continuasque in partibus his tensiones excitantem, post se relinquens. Omnibus his virium, a morbo hoc maligno putri exhaustarum, defectus visibilis, solidorumque totius corporis debilitas et atonia summa jungebatur. Præternaturalis ergo solidorum corporis ex debilitate morbofa nata irritabilitas, cum humorum universali acrimonia biliosa putrida conjuncta, non potuit, quin in partibus jam memoratis, præcipue tamen in tubo intestinali organisque secernendæ bili sacris, varias produ-



produxerit functionum anomalias, in
irritationes partium harum tenellarum,
earumque spasmos dolorificos cito trans-
euntes, per totum abdomen diffunden-
dos. Accedebat, quod dejectiones in præ-
cedente morbo copiosissimæ, dysentericæ,
acres, lubricantem internas intestinorum
parietes pituitam destruentes, et secum
asportantes, tantam intestinis conciliave-
rint irritationem, ut ex nato a ficcita-
te hac præternaturali, et attritu conti-
nuo partium, ingrato stimulo, acceden-
teque superstitè adhuc humorum enteri-
corum



corum acrimonia summa, primo tene-
sinus oriretur perquam molestus, quem
breui post, propagato magis magisque
per totum abdomen incitamento, colicæ
vehementes tussesque nostræ convulsivæ,
cum omni suo, quem recitavimus p. 90.
seq., apparatu, sequebantur. Infanticidæ
hæ, non solum inanes ciebant a succussi-
one diaphragmatis partiumque abdomina-
lium proficiscentes vomendi conatus, sed
spasmos quoque dolorificos, in abdomine
jam præsentés, adeo augebant, ut vel in
externas corporis partes non raro erum-
pentes,



pentes, epilepsias sæpius produxerint fatales, vel propagati in pulmones, visceraque vitalia, subitanæ ægro intulerint suffocationem.

Mirum ergo videbitur nemini, quod spasticæ hæ intestinalis tubi stricture in immediate appositas sibi partes transferint cito, ductumque biliarium communem in affectionum suarum traxerint communionem. Constrictus ergo vicinitatis jure choledochus hic canalis, pertransituræ bili exitum in intestinum duodenum negans, icterum necessario produxit



duxit temporarium, soluto spasmo solvendum similiter. Neque tamen solum hic choledochum ductum a spasmo hoc consensuali clausum reor. Subitanea icteri nostri eruptio altius propagatam hanc stricturem spasmodicam arguit. Non enim a clauso choledochi ductus osculo excretorio statim aurigo nascitur. Contractum ergo simul fuisse autumo ductum choledochum, hepaticum et cysticum. Forte et transiit ob violentiam morbi in bilia-
rios quoque hepatis poros ipsamque cystidem spasmus; quo facto contenta in
locis



locis his secreta jam ab humoribus reliquis bilis, retrograda via, vi, vel in vasa ipsa bilem fecernentia, vel in vasa vicina lymphatica acta, totique liquorum massæ reddita, celerem icterigenesin produxerit. Referri huc quoque meretur auctus post solutum a viribus vitæ spasmus sanguinis et humorum circulus, vi ejus promptior et intimior bilis cum sanguine mixtio, citiorque biliosæ flavedinis per totum corpus distributio.

Sed cur pertinacior temporis successu

obser-



observabatur idem hic icterus, et perstes
sæpe diu post pulsum priorem morbum?

Resp. Exprimebantur per repetitum hunc
spasmodum ex vasis biliaris jam recensitis
liquidiores, tenuiores et in vasa mino-
ra secernentia vicina admissibiles solum
subtiliores partes; restitante tam in bi-
liariis poris, hepaticoque ductu, quam
in cystide ipsa et canali choledocho, par-
te fellis reliqua crassa, spissa, tenaci,
amurcosa. Obstruebat hæc brevi propri-
as suas vias, exitumque sibi ipsa clau-
dens, transeunte continuo in M. S. li-



quidiore sui parte, icterum producebat
fixum, pertinacem, difficilioris sanationis.
Vide, quæ circa hanc regii morbi cau-
sam *Veslingius*, *Morgagni* illustrisque
Abrah. Vaterus in *Observ. rariss. circa*
calculum 3, § 1. Capit incrementa quo-
tidie hoc malum. Turbatur brevi ipsa
quoque bilis secretio, obstruuntur feri-
sim, oppilantur, officiumque suum obli-
ta cessant agere cholopoietica vasa, tan-
demque hepati ipso certissima inuritur
difficillimi judicii et sanationis labes,
infarctus, abscessus, similiaque alia nom-

minora



minora mala. A resorpto in sanguinis
massam pure hoc tetrissimo pthitis na-
scitur febrisque lenta lethalis. A commu-
nicato visceribus abdominalibus hepatis
morbo, natoque necessaria lege et in his
quoque infarctu pessimo, hydrops gene-
ratur non minus insanabilis et q. f. r.

Quoad prognosin. Patet hæc partim
ex antecedentibus. Addam paucis illa,
quæ clinica observatio docuit. In genere
totus hic morbus periculosissimæ fuit
aleæ, pluresque necavit, ad quos sanan-
dos omnia adhibita fuerunt artis præsti-



dia. Obierunt tenelli per omnia morbi
stadia. Hi ad ferendos atrocissimos ven-
tris cruciatus morbique externæ violen-
tiæ impares, sub rigore universali, au-
riginis nostræ solito præcurfore, fato sue-
cedebant. Illi statim in primo morbi
principio graviter convulsi moriebantur.
Alii intercluso a ferina tussi subito spiri-
tu efflabant animam, magnaque recon-
valescentium pars post superatum multo
labore primum morbum, ex humorum
corruptione, a pulmonum acquisita labe
vel ab hydropè interibat. Genti tamen
rusticæ



rustica plus intulit damni, tristioremq;
multo inter hominum hoc durum ge-
nus lufit scenam, quam in urbe ipsa.
Desiderati sunt in uno ditionis Effendi-
ensis tractu, versus occidentem urbis sito,
Borbecensi, pusillorum juvenculorumque
fere trecenti; quibus autem, quod uti-
que adverti meretur, maximam partem,
rustico more, vel vaga, vel fera nimis
adhibita remedia fuerunt. Jcterus hic,
quum mere symptomaticus esset, ad ju-
dicandos socios sibi morbos contribuit ni-
hil. Declinantis tamen paroxysmi in prius-



cipio fuit plerumque index; non ubique. Quod reliquum est, per se neque felix dedit, neque triste augurium. Dum primo invaderet, soluto spasmo solvebatur. Solutum vero spasmus cessans urinæ difficultas, reclusa alvus, sudorque erumpens indicabant. Permanens ischuria, obstructaque alvus, longiorem ubique morbi moram difficilioremque sanationem fore, præfagiebant. Post enatum iterum singultus cum permanente excretionum dispendio, convulsiones artuum mox æcuturas nuntiabat. Erumpens



sub ipsis convulsionibus, vel post easdem, icterus ubique lethalis fuit. Sæpius recurrens, sensum rebellis, medicationi diu multumque obliuctabatur, sique diutius protraheretur, arti tandem indomabilis, modo jam ante indicato, in alios morbos transit, ut plurimum lethales. Tristis hæc oeconomix animalis fors est, ut ex parvulis initiis nascens sæpe non majoris momenti morbus, mox alium pariat diversæ naturæ et longe graviolem affectum, qui ipse cum sobole sua, quam satis cito generat, pulso licet primario



morbo ejusque causa nihilo minus in corpore remanet, augmenta ex se ipso capit, machinæque totius sensim fulcra suffodiens, mortem ægroto tandem infert. Natorum sic asthmatum convulsivorum, hecticarum, hydropum pectoris, ascitum, hæmorrhagiarum enormium, graviumque aliarum affectionum ex ictero post productos hos morbos cessante, exempla notata a pluribus sunt.

Si in curatione icteri cujuslibet ex *Hoffmanni* præceptis summa prudentia & circumspectione utendum est, profe-

cto



eto in hac regii morbi specie collocanda erit ad rationalem curam omnis medici industria. Scimus, magnos saepe usus præstare in variis icteri generibus adhibita emetica et nonnunquam præsentissimum ferre auxilium; præsertim, ubi obstructi a materia quacunque vel viscida vel calculosa mobili canales biferi fuerint. Nocent autem in omnibus ex spasticis intestinorum affectionibus progenitis icteris quam maxime; violentas enim partium stricturas et augent et propagant ulterius. Nocuerunt quoque in nostro morbo. S 5 Simile



Simile quid circa purgantia obtinet, quæ interdum in hoc morbi genere indicatissima deprehendimus. Et hæc spasmus quoque primarum viarum, præprimis si fortiora fuerint, maxime augent, sicque oleum accenso jam igni affandunt. Hinc jam artis nostræ princeps *Hippocrates* in Libro suo de ratione victus in ægris nec non *Liber. de affect.* sect. 5. medicos, ut a purgantibus in ictero caveant, bene monet. *Periculo*, inquit, *expones ægrum; non jurebis.* Hoc transtulit incedens quoque *Coelius Aurelianus* Lib. 3. cap.



3. cap. 5. imprudentem ventrisuorum
et cholagogorum usum magnopere in-
crepat, quum materia ex horum medi-
camentorum, absinthii nempe, aloes,
colocynthidis, similiumque drasticorum
administerio deterior fiat. Hinc nescio, qual
na fortuna factum fuerit, ut in ictero, a
colica spasmodica nato, tantos hauserit
ex rhu Julappe fructus *Rolsincius*, qui
remedii hujus exhibitionem in ictero con-
tra *Mercatum* in Dissertatione sua de
Tartaro defendit.

Sudorifera, praesertim calida volatilia,





quæ motum fluidorum intestinum sum-
mopere intendunt, solidarum vero par-
tium tensiones et crispaturas augent, exula-
re non minus ex icteri cura jubemus.
Urgent hæc, quæ in ostiolis vasorum
minimorum hæret, materiam viscidam,
tenacem, eamque altius in teneriores et
angustiores canales incuneando, infar-
ctus nascentes augent, totumque morbum
non pertinacissimum solum, sed indisso-
lubilem sæpe reddunt.

Curatoria autem principalis icteri spa-
smodici indicatio eo dirigenda est, ut
spasti-



spastica hæc fibrarum tubi intestinalis
valde irritabilium nervosarum crispatura
quantocyus solvatur, adeoque bilis tam
secretio suspensa, quam ejus ad duode-
num descensus impeditus naturali red-
datur libertati; utque tandem, soluto per
indicata remedia spasma, acrimonia hū-
morum, præcipue bilis, quæ spasmodum
hujusmodi genitrix esse judicatur, mi-
tigetur, et ex intestinis eliminetur. Ex-
hibita itaque ad feriendum hunc finem
in nostro casu varia sunt sub paroxy-
smo ad involvendam hanc hærentem in
primis



primis viis spasmorum matricem, materiam acrem, irritantem, blanda mucilaginosa, quæ, quum simul deperditæ lubricantis intestina liquidi vices gererent, præternaturalem quoque partium attritum natamque exinde nimiam tubi intestinalis irritabilitatem moderabant.

Ad fovendas lubricandasque et relaxandas a spasmō hoc violento constrictas fibras in usum vocabantur remedia selectissima emollientia. Dabantur ad fovepiendam telarum nervearum sensibilitatem nimiam, morbosam, medicamenta



sui ordinis anodyna lenissima, emulsionēs
ex feminibus frigidis, papaverinis, can-
nabinis &c. Injiciebantur ex emollien-
tibus blandissimis clysmata. Hoc enim
remedii genus, dum in colon, quin, et
altiores etiam intestinorum tractus sub-
intrat, in omnibus viscerum abdomi-
narium, præsertim hepatis et vesiculæ
felleæ morbis, ubi emolliendum est, o-
ptimi demulcentis fatus præstat officia.
Involvebatur similibus herbis, floribus
que sambuci, meliloti, chamomillæ,
semine lini, fœnugræci, hyosciami, fa-



rina orobi, avenæ, bulbis liliorum alborum
&c. in lacte dulci decoctis et saponi ve-
neto nuptis, totum abdomen, præpri-
mis hypochondrium dextrum. Accede-
bant omnibus his pediluvia et succupia
tepidæ, blanda: Verbo, emolliabatur
quoque modo externus corporis cortex
ad superandas internas abdominalium
viscerum stricture, viam præeunte ex-
perientia, docente, solvi internarum parti-
um spasmos, emollita externa corporis su-
perficie et stringi versa vice abdominalia
viscera a spasmodicis externarum par-
tium



tium fricturis. Dignissimum sane lectu
est caput octavum egregii illius tracta-
tus, quem *de morbis nervosis* scripsit *Ro-
bert Whyt*, circa insignem petiluviorum
in morbis spasmodicis usum. Optatissi-
mos ex his effectus in similibus morbis
tulit *Hoffmannus*. Egregiam, quam in va-
riis infimi ventric affectionibus opem prae-
stant, descripsit *cl. Stevenson*; ususque
eximios hujus balnei in colica biliola
spasmodica recensuit in *actis Edimburg*,
tom. 3. obs. 27. *Rob. Porter*.

Doloribus cardialgicis vehementioribus,

T

nimiis.



nimiisque et inanibus ad vomitum conatibus, præter memoratum jam externum abdomini applicandum fenum, epithema ex theriaca, camphora et paucis croco paratum egregie medicabatur.

Neque minoris usus ad compefcendos vehementiores hos spasticos dolores fuit applicatum externe oleum amygdalarum dulcium calens camphoratum.

Soluto paroxysmo ad mitigandam educendamque ex corpore materiam acrem, firmandasque contra novos spasmodicos insultus partes solidas; pulveres exhibebantur

absorbentes



absorbentes, nitrosi, antispasmodici cum
rhabarbaro, moscho, castoreo, sulphu-
reque antimonii aurato, moritati cum
notabili symptomatum decremento.

Si autem profectionior jam morbus, me-
dicationi huic inobediens, post solutum
quoque paroxysmum spasmodicum per-
siles, fixior loco suo hæserit, patueritque
ex aliis lassis functionibus, recessisse jam
a crasi sua laudabili sana bilem, obstru-
cto-que jam a materia tenaci biliosa picea
ductus felleos, resolventia lenia, tartar-
ea, melle, mollientibusque aliis no-



minatis jam remediis intermixta cum fructu adhibebantur; præsertim quum balneum accederet jam indicatum emolliens, lenisque totius dextri lateris frictio humida. Quod ceterum ad icteri spasmodici consensualis curam attinet, attendendum ubique est ad principalem spasmi præsentis causam ex antecedentibus haud difficulter noscendam, qua sublata effectus quoque ipse sponte sanabitur. Sic v. gr. natus in nostro casu icterus a tussi convulsiva, ex suis causis producta, sanata hæc statim in principio

per



per vomitorium appropriatum, subjun-
ctisque evacuanti huic remedio medica-
mentis roborantibus antispasmodicis, cor-
tice peruviano, castoreo &c. levi opera
præveniebatur. A mensibus vel hæmor-
rhoidibus suppressis excitatus icterus re-
stitutis his hæmorrhagiis absque alio fe-
re remedio sponte cessat. Qui a meconio
in infantibus præter naturam retento,
intestinorum canalem acri sua indole ir-
ritante, vel a collostro caseoso, in tubo
intestinali tenellorum collecto, gignitur;
ejecto per idonea medicamenta meconio,



folutoque et educto per saponacea et
evacuantia leniter remedia coagulo hoc
gravante, certo curatur. Quem retrogres-
sa podagra aut arthritis producit regionum
morbum reddita suis locis materia po-
dagrica vel arthritica solvit. Jeterum a
vermibus natum anthelmintica fugant.
Ab hernia incarcerata genitus, repositis
in situm naturalem partibus, evanescit
per se. Quæ ab acri vellicante quacun-
que materia, intestinorum parietes sti-
mulante, procedit aurigo, correctæ, vel
obvoluta, vel educta hac, brevi cessat.



A suppressis intempestive febribus, vel a cohibitis malo consilio alvi fluxibus criticis excitata ictericia, reducta in orbitam suam febre, restitutaque excretionem alvina, sponte cedit. Vidimus jam in antecedentibus plura icterorum hac methodo sanatorum exempla. Cavendum autem angue et cane pejus, ne intempestivo opiatorum ad sopiendos spasmos usu, agro noceamus. In scyllam incidit, qui charybdem sic vitare nititur. Terre re nos utique exhibitorum cum insano successu hujuscemodi medicamento-



rum exempla debent, quæ cl. *Joung* memorix prodidit in *Actis Edimburgensibus*, graviaque illa symptomata, quæ ill. *Muxelius* ex perperam ministrato opio in observationum suarum manipulo altero recensuit. Par omnino ratio est icteri, aliorum morborum focii vel prolis. Sic febrium intermittentium comes, antifebrilibus; hystericas passiones concomitans antihystericis profligatur.

Tantum de ictero hoc spasmodico, cujus historiam in tractatuli hujus limine promiseram. Liceat mihi, antequam colophonem



Iophonem operi imponam, peneis adhuc
unam atque alteram, a variis varie ven-
tilatam circa hunc morbum, quaestionem
manuissæ loco evolvere. Lis est, de na-
tura icteri periodici. Queritur, quæ ejus
ratio? Resp. Nota omnino, et confirmata
observatione multiplici res est, plurimas
nervorum, vel telarum nervearum sen-
sibiliorum affectiones a causa fontica pro-
ductas, et inter has potissimum primæ
digestionis organorum passioncs (d) in

T 5

quan-

(d) Lectu per quam digna est, quam *de*
primis viis morborum periodicorum sede
frequentissima exhibuit Dissertatio cl.
Büchnerus Halæ 1768.



tum spasticis partium stricturis ansam
præbere solent, statâ suâ servare exacer-
bationis tempora, quibus natura id, quod
molestum sibi et nocivum sentit, vel
corrigere vel ejicere e corpore satagit;
quamquam mechanismus huic operi a
natura adhibitus inexplicabilis hucusque
sit; et fortassis mansurus sit adhuc.
Sic a tendinum læsionibus convulsiones
periodicis regulares observaverunt plu-
res, exhibuitque nuper adhuc in *Novis
Academiæ Naturæ Curiosorum Actis* tom.
5. cœs. 26. cl. *Construch* memorabilem

huc



huc referendum casum doloris periodici
ei atrocissimi, nervorum distentionem mi-
nitantis, alternis diebus regulariter affli-
gentis, ab evulso rudifabri ferrarii ma-
nu dente molari nati. A morfu anima-
lium vel rabioforum vel iratorum, par-
tes tendineas lacerante, furores, convul-
sionesque periodicas in diariis Gallicis
legimus. A vermibus intestina rodenti-
bus manias, certo tempore recurrentes;
abile caustica, tubo intestinorum infusa,
choleras periodicas; pluresque alios, a si-
milibus causis natos morbos ex observa-
tionibus



tionibus quam plurimis variorum aucto-
rum novimus. Taceo intermittentes o-
mnium ordinum ex iisdem et paribus cau-
sis nascentes febres. Hinc et icterum quo-
que, ex eodem hoc fonte progenitum,
periodicum esse, mirum nemini vide-
bitur. Legi possunt aurigina hujusmo-
di periodicorum regularium exempla in
operibus saepe jam citati *Hoffmanni*, in
animadversionibus medicis *Dekkeri* pas-
simque alibi. Altera icteri periodici re-
gularis species illa est, quæ ab affecti-
bus per se periodicis nascitur, v. gr. a
febri-



febris intermittenibus male curatis,
a menibus suppressis vel difficulter flu-
entibus, ab hæmorrhoidibus turbatis &c.

Ex omnibus his causis regios, et quidem
periodicos regulares, morbos in antee-
dentibus jam pluries citavimus. Tercio
loco icterus quoque ille inter periodicos
regulares nominandus est, sub cujus lar-
va alius morbus spasmodicus regularis
v. gr. febris quædam intermittens latet.
Hic foli chinæ cortici cedit. In varias
febris intermittens sese formas interdum
induit, vix credibiles. Probant hoc hau-



fla ex observatorum monumentis exempla fere innumera. Sub vomitionum, diarrhoearum, ophthalmiarum, cholerae, asthmae, epilepsiae, cardialgiae, peripneumoniae, rheumatismi, nephritidis, apoplexiae, aliorumque morborum periodicorum forma, febres tales delituisse memorat in tractatu, quem *de protheiformi febris intermittentis genio* scripsit *Morronus*; aliaque scita admodum digna febrium larvatarum exempla exhibuerunt *Foresius* Libr. 4. obs. 39 *Bianchi* *Histor. Hepat.* 751. *Aetius* *Tetrabibl.* 2 ferm. 2



cap. 3 *Torii Therap. spec. Libr. I. cap.*
10. Libr. 3. cap. 5 & 6. Schellhammer
Tract. 8 de Nat. p. 275., quibus adjungi
poterunt, quæ passim cl. *Werlhof, Hux-*
ham, Sydenham, & Lauter circa eandem
hanc materiam congefferunt. Rarum præ-
terea febrium intermittentium genus,
totum corpus non occupans, sed speci-
alia solum quædam corporis loca inva-
dens, huc quoque forsan referendum
descripsit medicus Bathoniensis cl. *Le-*
sons in tractatu cui titulus: *Practical*
Essays upon intermitting fevers. Eius tæ-
men



men et ante hunc, qui febres hujusmodi particulares crediderunt. Dantur præterea aliæ adhuc icteri intermittentis, non quidem periodici regularis, sed recurrentis vagi species. Prima inter has illa est, quæ a vermibus nascitur, vel potius a lambricis intestinorum teretibus. Accidit subinde, ut hi ex natali loco profugi, peregrinam fortunam tentatim in choledochum ductum intrent; representent tum toto suo corpore memoratum hunc canalem, claudant eundem bilisque in intestina descensum prohibent

omni-



omnino. Regurgitare ergo in proxima
minora vasa exitu prohibitam bilem fie-
rique icterum necesse est, qui tam diu
manebit, donec vel superatis canalium
biliariorum angustis in cystidem pene-
traverit lumbricus, vel retrograda via
in duodenum sese receperit. In priori
casu icterus toties recurret, quoties morfu
suo irritabit internam cystidis tunicam
maxime lenilem vermis, et nascetur ab
irritamento hoc acutiori contractio par-
tium spasmodica. De his in anteceden-
tibus plura. Forre per semina sua ali-

c. 22. §. 1. 2.

U

quando



quando ad hoc vel illud viscus cum chylo, sanguine, aliisque humoribus deponuntur varii generis insecta, variaque tunc creant a propria sua fabrica, locique sui natalis, seu visceris, in quo hospitantur pendentia mala; et hæc icteros producere poterunt puncturis, morfibus, rofionibus, reptatibusque suis, si in hepate porisque biliariis hæserint. Alia arcuati morbi vagi recurrentis species est, quæ a calculis felleis, egressum ex cystide per angustiores canalem emissarium molientibus, fit. Concretiones hæ præter

naturales,



naturales, quarum ingens saepe copia in cystide fellea hærere simul solet, (e) ex quacunque vel externa vel interna causa sedibus suis motæ, et ductui excretorio impactæ, internas horum meatuum tunicas perquam sensiles, acutis suis, quibus pollent, angulis, irritando et lacerando vel spasmus gignunt vias has constringentem penitus, vel mole et volu-

U 2 mine
(e) Calculorum hujusmodi felleorum 123 simul in cystide invenit *Fallopianus*; 300 *Bartholinus*; 700 *Mentzelius*; plus mille in hac vesicula detexit *Græsecus*; bis mille in senis cujusdam cystide coacervatos vidit *Storobinus*; numeravitque triatalium calculorum millia sexcenta et quadraginta sex in cadavere gladiatoris *Fascinus*



mine suo canales biliferos ita infarciunt
et obstruunt, ut, sufflaminato bilis in duo-
denum itinere, reflua hæc in sanguinem
icterum producat toties intermittentem,
quoties vel relapsus in locum natalem
vel excretus in duodeni cavum calcu-
lus talis fuerit; recurrentem vero, quo-
ties alias demuo solutus a volumine com-
muni calculus, eandem luserit scenam.
Consule de hoc arquati morbi intermit-
tentis genere cl. *Strietenium* in aphor.
Boerhaav. Tit. de ictero multiplici; item
Thom. Sympson in Actis Edinburg. tom.
2. art



2. art. 28, nec non eadem acta tom. 1.

art. 33. præterque hos *Morgagnum*, *Schef-*

feliū, *Valisnerum* et *Baglivium*. Ulti-

nam tandem a bile ipsa morboſa proſi-

ſiſcentem icteri intermittentis ſpeciem

ſic concipio: Tardatur, vel ex præter-

naturali bilis quadam ſpiſſitudine mor-

boſa, vel ex anguſtato a quacunque cau-

ſa ductu choledocho, liber fellis in in-

teſtina deſcenſus, reſorbentur ſenſim per

ſubtiliora lateralia vaſa bilis partes li-

quidiores, remanet craſſamentum, quod

intra certum quoddam tempus ita au-



getur, ut omnino obstruat biliferos canales pariatque sic icterum. Sanatur hic verisimiliter per excitatum a natura spasmus violentum, vel febrilem, vel per vomitum aut diarrhoeam torminosam, cujus ope collecta hæc spissa et immutabilis materia, vi vasorum jam spastice agentium resoluta, ex canalibus, quas obturaverat, in duodenum exturbatur. Redit, simulac collectum novum ex bile crassamentum, choledochum ductum obsidens, fellis iter denuo interceperit, novamque icteritidi suppeditaverit ansam.

Accidit



Accidit frequenter, ut aut socius febris intermittentis observetur icterus, aut ejus præcursor. Quæritur: quæ hujus phænomeni ratio? Resp. omnis paroxysmi febrilis prima scena spasmus est, notabilis periphericus, a partium internarum crispatura natus, quem horrorem vocamus, qui tamen subinde per varios gradus in tremorem, in violentam corporis fluctuationem, in veros artuum motus convulsivos, in epilepsiam augeatur. Exempla *Mortonus in Pyretologia Exercit. 1. cap. 9.* exhibuit. Recensuit

alia in tractatu epistolari de *purpura* ad
cl. *Baldingerum* dato cl. *Hauves*, recen-
suerunt alii plures. Interdum suc-
cedit in memorati hujus spasmi peri-
pherici locum spasmus quidam particu-
laris, modo hanc, modo illam, vel ex-
ternam, vel internam corporis partem
quatiens, ægrum non raro et medicum
ludens, cujus memorabile exemplum in
descriptione epidemiæ nostræ annorum
1769 & 70 p. 117 dedi. Ponamus jam:
occupari a spasmo hoc febrili particulari
ventriculum vel intestina. Fit hoc per-

Cæpe;

sepe; præprimis ubi fomes intermittens hujusmodi febris materialis, quem natura per excitatos hos violentiores motus subigere et ejicere ex corpore nititur, in ipsis primæ digestionis viis hæserit. Et fieri, manifesto patet ex familiaribus nonnullarum febrium intermittentium symptomatibus, ingruentem paroxysmum immediate præcedentibus, ejusque accessum jam jam erupturum plerumque præsagientibus, v. gr. nausea, cardialgia, bulimo, vomitu, singultu, doloribus colicis, borborygmis et



q. f. r. Transit ex tractu intestinali hęc
partium crispatura in officinam biliari-
am, sustinuat bilis tam secretionem,
quam excretionem, agit succum hunc in
vasa vicina, qui, accedente brevi post-
astu febrili, humoribus intimius mix-
tus, per totum corpus subito diffun-
ditur, cutimque universam foeda flave-
dine tingit. Et quid quaso impedit,
quominus ipsum choledochum ductum
a spasmō hoc febrili aliquando directe
affici credamus? Compara cum modo
dictis casum illum singularem, quem

Bonetus



Bonetus in nota ad observ. 17. sect. 18. libr. 3. proponit, viri cujusdam, qui a doloribus intestinorum spasmodicis in icterum delabebatur, simulac remedia calida sudorifera ad compescendos hos dolores adhiberentur. Ultimum jam sequitur inquirendum paucis: quo fundamento niti possint illa, quæ ex accessu morbi regii in febribus acutis desumfit prognostica tam in coacis suis prænotationibus H. a. 531, quam in aphorismis 62 & 64 sectionis 4. *Hippocrates?* Scribit ille aphor. 62. *Quibus in febre*
mor.



morbus regius supervenerit ante septiman-
diam malum est. Et brevi post aphor.

64. Quibus in febre septima, nona, un-
decima aut decima tertia die icterus super-
venit, bonum est; nisi dextrum hypochon-
drium indurescat: In hoc casu non bonum.

Item ipsam experientia confirmat. Plu-
re sunt, nota ex observatoribus, morbo-
rum acutorum genera, quibus criticus
talis accedere solet icterus. Observavit
Hoffmannus in *Med. rat. syst.* Tom 4.
Spec. Morb. Pathol. Cap. 12 thes. pathol.

§ 17 febres illas, quæ cum spasmis in-



fini ventris vomituque bilioso et intensiori æstu stipatæ in corporibus hypochondriacis fuscitantur, ictero superveniente feliciter terminari. Docet idem in Praxi sua nova cl. *Shaw*, cap. 13. art. 4. p. 305. Morbo illo epidemico mucoso Göttingensi annorum 1760 & 62, quem illustris *Röderer* et *Waglerus* describunt, pariter criticus accedebat icterus. In febre cholERICA critice supervenientem icterum felix ubique augurium dare notat *Commercium literarium*. N^o. *rimbergense* an. 1737, hebdom. 37. art. I, ubi



ubi idem hoc ex observatione cl. *Burgi*, quam in *Satyr. Med. Silesiac.* de feбри causode, ictero critico soluta, exhibuerat, confirmatur. Mali præfagii auriginem morbo Vratislaviensi epidemico an. 1699 accessisse, fert hujus grassationis historia pag. 14. Feбри acutæ, cum doloribus lateris conjunctæ, sexta die icterum supervenisse, memorat *Pelargus* in observat. clin. an. 1730 mens. Apr. p. 428, qui et regium hunc morbum feбри catharrhali die septimo critice supervenientem vidit an. 1729 mens. Nov.



p. 265. Rarum tandem et singulare prorsus icteri critici exanthematici exemplum in *Commerc. Liter. Norimb.* an. 1733. hebd. 2 recensetur. Spasmodica hec morbi regii species matrem habet perturbationem illam, seu spasmus solennem universalem, qui temporibus criticis excitari a natura solet, ad coquendam, vel præparandam, expulsiõni destinatam, materiam morbosam. Nulla omnino crisis sit febrium acutarum sine prævio hoc naturæ opere præparatorio. Hinc laboriosa illa emergit, ipsam morbi crisin im-

medi-



mediate antecedens periodus, quam et *Hippocrates* in coacis notavit. Si spasmus hic, a natura medicatrice activa excitatus, viribus vite, morbiq; magnitudini appositus ita fuerit, ut subigi causa morbi materialis, vel ejici ex corpore simul omnis possit, in vade res est, et sequitur plenaria morbi solutio. Si autem vel fracta jam vite vires ad opus hoc morbi curandum non sufficiant, vel si spasmus hujus, a natura excitati, vis minor sit, quam que ad excitandam partium reactionem requirebatur, vel materia mor-

bi nimis cruda et tenax partique affectæ altius infixæ hæreat, quam quæ resolvî intra datum tempus, corrigi, vel ejici ex corpore tota possit; crisis nascetur imperfecta; si vero idem hic spasmus vires vitæ vel comminuat ipse, vel partes fortuito occupaverit, coctioni aut expulsionî materiæ peccantis destinatas, mortem inferet corpori, ad cujus salutem fuerat fuscitatus. Si ergo spasmus ille internus, cujus præsentiam icterus insequens arguit, ante septimum febris acutæ diem oboriatur, ante quem raro

perfecta materiæ febrilis coctio fieri so-
let, vantis erit, vires vitæ, ad superan-
dum morbum necessarias, sine fructu
exhauriet, coctionis ipsum opus præpe-
diet, liquida corporis corrumpet, morbum
que ipsum et longiorem et periculosiorem
faciet. Malum ergo dabit pro ægroto au-
gurium. Excipe, si febris hujusmodi acu-
tæ fomes vel in primis viis earumque
diversoriis hæreat, ex quibus mediante
hoc naturæ nixu violento absque prævia
longa præparatione exturbari omni mor-
bi tempore potest, vel si salutare hoc



naturæ molimen hæmorrhagium excita-
verit crânicam. In utroque hoc casu boni
felicitisque præfagii esse poterit nascens an-
te septimum quoque diem ex tali spasmo
ictus. Confirmat utrumque per obser-
vata sua in Epidemicis Hippocrates H.
a. 663, ubi *quibusdam inquit morbus re-
gius accedit sexta die; verum his purga-
tio per vesicam aut alvus exturbata aut
larga sanguinis eruptio profuit. Idem in
Prorhet. libr. 2. cap. 13. it 29. 7 & 8.
repetit: Quibus sexto morbi die icteri fie-
bant, his dysenteria supervenientes morbum*



solvebant. Quoad hæmorrhagiam, quæ
 icterum hunc criticum spasmodicum, si
 boni præfagii esse velit, sequi ex *Hippo-*
cratis sententia debet, exhibuit diligen-
 tissimus observator *Cous* et hujus quoque
 eventus historiam in *Epidem.* 7. v. *Char-*
zer Tom. 9. p. 599, ubi de Heraclidis con-
 jugæ narrat: feбри acutâ laborantem illam,
 tertia morbi die ictericam factam, per
 largam subortam narium hæmorrhagiam
 fuisse sanatam. Faustam ergo et latam
 ubique prognosin in febribus acutis icte-
 rus ille dabit, qui perturbationis illius
 magnæ,



magnæ, vel spasmi jam memorati interni, crisin morbi molientis naturæ, signum præbet, et a crisi ipsa excipitur, idque diebus criticis bonis. Sin vero vel ægri vires, jam fractæ prius, non suffecerint ad producendam perfectam crisin; vel si viscus quoddam speciale, aut illa specificè corporis pars a spasmo hoc præ aliis fuerit occupata, cujus ope, vel per quam evacuatio intentata critica fieri debuisset, male ægroti rem agi, me non monente constat. Primum apparet ex loco Hippocratico Epid. 1, Text. 45 & 65



Charter Tom. 9. p. 66. Alterum ex Her-
mocratis exemplo, quod idem *Cous* Epi-
dem. 3. agr. 2. notavit, ubi loco eru-
pturæ, fortassis per organa uropoietica,
vel per vasa sanguinea narium, criseos,
urinæ aquosæ tenues, et delirium, utrum-
que spasmos memoratarum partium de-
signans, funestum tulit icterus superve-
niens præsagium. Pertinet huc *Celsi* ef-
fatum, libr. 2. cap. 7. p. 58.

Sed accedit quoque febribus malignis
putridis icterus, non criticus, sed mere
symptomaticus, fœdissimus ut plurimum au-
gurium,



guri, non ex spasmō partium, sed ex
solutione humorum putrida, præsertim
bilis ejusque cum reliquis corporis no-
stri humoribus mixtione, omni morbi
tempore, diebus tam vacuis quam cri-
ticis enascens, a priori caute distinguen-
dus. Docuit nos idem artis nostræ pa-
rens *Cous* characteristicam illam notam,
quæ criticum talem icterum, a spasmō
partium interno natum, a symptomatico
interstinguit. Dicit in libro suo de victu
acutorum: *In febre biliosa*, quam per tur-
batam alvum critice solvi jam supra mo-



nuinus, ante septimum diem cum rigore morbus regius accedens, solvit febrim: si vero sine rigore accedat, extra temporis occasiones, i. e. dies criticos, perniciosus est. Rigor ergo signum ubique indubitatum stricturearum internarum spasticarum secundum Hippocratem esto, hinc nati in substrato casu ex his quoque icterici. Confer hic sequentia Coi loca. Aphor. 58, 46, 63. sect. 4. et Epidem. 6, 1, 9. quibus jungi poterunt illa, quæ Galenus in Comment. ad Prophet. 6. it. ad sect. 4. aph. 29., nec non quæ Hoffmannus in



Operibus tom. 3. sect. I. cap. 5.

En igitur L. B. paulula et indigesta
quædam circa illam icteri speciem, quæ
a spasmò nascitur, attentione Tua, ut
spero, non omnino indigna, Multus in
tractatione hujus thematis, quamquam
amplissimum differendi habuerim cam-
pum, ut esset, nec temporis copia,
nec mens fuit: Et stetit me quoque
promissis, in opusculi limine Tibi datis,
sufficiens credo. Vale! nostrisque labo-
ribus in quantum utilitati Tibi esse
poterunt benevolus utere!



HISTORIA

ICTERI PERIODICI LETHALIS.

Vir. perillustis ex ordine equestri, cui liberalis corporis habitum, proceram staturam, roburque vere virile largita fuerat mater natura, annos suos juveniles, quos inter generosa corporis exercitia, in hippodromo, palæstra, saltatorioque ludo, actuosus semper consumerat, sanissimos transegit, licet strictiores frugalitatis leges non ubique observaverit. Ante aliquot lustra tempus erat, quo natis in usum lætitiæ scyphis pu-

gnare



gnare Tracum more mos erat: Hæc potius
modus illa erat, qua vires annos ingre-
diebatur. Quid mirum, si vitæ et fan-
tati adeo damnosæ huic consuetudini da-
re interdum aliquid cogereur, nisi ho-
minis singularis invisum nomen ab ami-
cis mereri vellet. Lautus ad hæc victus,
rerum seriarum incuria, vita, si itinera-
tiones aliquot breves voluptuarias exce-
peris, deses et delicatula, cui dispositio
hereditaria magnaue ad excandescantias
animi promptitudo accedebat, hospitem
tandem ingratum, pauperum tabernas

raro

raro incolentem, divitibus autem laetiorisque fortunæ hominibus familiarior, sacram podagram vitæ insequentis fidum aliquamdiu comitem ipsi acquisivit, tanto semper crudelior, quanto magis genio suo indulserit herus. Ne autem sola in corpore hoc bene curato esset et vidua podagra, alia accessit morboz filia, plethoræ excedentis medicatrix et fecia, hæmorrhoids, magno per paroxysmos cruciatu virum hunc illustrem divenans, postque longos et irriter utplurimum conatus, periculum de-

num



nam cruoris attri cum tenaci muco remixti eritens. Per annos aliquot continuos alternis hæc vicibus affligebant Æc, ut tempore plerumque brumali podagra, reliquo autem hæmorrhoidibus per periodos ægrotaret. Sub hoc tempus, mortuo fratre, in patria bona succedens, et confortio amicorum creptis inique senectutis factus, vitæ usque huc actæ valedixit, sobriamque, et sanitatis legibus accommodam magis vivere instituit vitam. Quo factum est, ut accedente simul congruo corporis exercitio, a rerum

necessa-



necessariarum præsertim ruralium attentiori cura procedente, per longum tempus non solum a podagra et hæmorrhoidibus manserit omnino immunis, sed ut adeo firnum recuperaverit corporis habitum, ut bis maritus, tredecim liberorum pater, per quatuor integra iustra vixerit sanissimus. Tandem sexagenario major, variis animi curis circumactus, segniorque ad consuetos corporis motus, domui continuo affixus, relabi in vehementiores animi excandescencias data vel minima occasione, maleque inde semper
habere



habere instituit, sic, ut diarrhoea jam corriperetur, jam nausea, jam doloribus colicis aliisque spasmodicis infimi ventris motibus; vel erratica febre languenteque per aliquot dies appetitu exinde mulceretur. Adhibita his malis interdum evasuantia aliaque ab agro ipso congrua reputata temperantia remedia recurrentes hos saepe paroxysmos feliciter profligabant; minimus autem in nonnaturalibus rebus commissus error novas semper creabat molestias atrocissimosque tandem a spasmico ventriculi oriundos dolores qualibet vice



vice producebat. Jam anxius fieri, jam neglecta ante ad radicalem curam proposita remedia sollicitè quærere, omnemque ad debellandum atrox hoc malum movere lapidem cœpit; nec frustra: filius it per aliquot menses morbus, felicesque jam ab usu medicamentorum eventus sibi gratulabatur illustris æger, cum nuptias filię celebrans, infirmitatum suarum immemor, genio suo forte largius indulgens, doloribus acerbissimis circoscribiculum cordis, ad dextrum latus usque propagatis, corripere, post semihor-



nium largo bilioso vomitu solutis. Ad
hæc horrere incipit, tremere, præcordio-
rum anxietatibus et frigore fere socratico
per aliquod tempus premi. Quæ tamen
omnia accedens naturali auctior calor
profususque erumpens sudor sensim fu-
gavit. Jam somnus sequebatur profun-
dus, per quadrihorium forte protractus,
quo finito, depulsum omnino credidit
morbum ægrotus. Brevi autem post co-
scitationes levisque lumbos perreptans fri-
gidioris auræ sensus, nasi refrigerium
unguiumque et digitorum manus cœrit-



lescen-



lescentia novum nasciturientis febris insultum indicabant. Sine doloribus, sine vomitu, sine tremore hic quidem decurrebat, effero tamen aestu corpus fatigabat, sudoresque exprimebat effusissimos. Reddita hoc tempore urina primo ignea fuit, dein profundo rubra, mox ad saturatissimum colorem brunum vergens, ultra fidem crassa, turbida, vere icterica, papyrus lintheaque immissa saturatissimo croceo colore perfudit. Simili modo et manans pleno rivo ex corpore sudor quævis ad eundem detergendum

adhibi.



adhibita lintea intensa flavedine tinxit
totamque corporis superficiem colore sa-
turato aurantio notavit. Obviam huic
morbo ibatur, dum in paroxysmo vio-
lentiora natura molimina remediis notis
antispasmodicis temperarentur, pulso
autem hoc, effusa in sanguinis laticem
biliosa materia aptis medicamentis exter-
minaretur, simulque aperientibus et re-
solventibus remediis bilis spissitudo, quæ
subesse, nec immerito, judicabatur, cor-
rigeretur ejusque coagulum funderetur.

Hoc fine, et ne collecta forte in primis viis



faburra morbo novum feminam submi-
nistraret, suadente cl. *Leidenfrosio*, cu-
jus prudentissimis consiliis in morbi pro-
gressu saepe dein usus fui, tincturam
rhabarbari aquosam cum liquore terræ foli-
atæ tartari maritatem, per plures septimanas
continuas haussit. Neque et hoc remedi-
um auspicios tulit opes; præcipue quum
accedente hyeme, et cum hac intem-
pesto et pluvio cœlo ad omne commoti-
onum solitarum genus via non solum
præcluderetur, verum ipsa quoque mens
magis quam par erat negotiis intenta,

ingrat.

ingratis continuo affectionibus agitaretur.

Hinc quovis fere mense eundem hunc paroxysmum febrilem, ictericum, primo per omnia similem, vehementiæ solum gradu dissimilem, passus est, sine ullo vel minimo corporis visibili detrimento.

Appropinquante vere, multifariis sub elementiori coelo institutis levioribus corporis exercitiis, itineribus brevibus, deambulationibus, equitationibus, vectionibus in rheda, potuque medicato ex succo herbarum recentium, cichorei, taraxaci, fumarie, cherefolii, nasturtii, cochleariæ,

Z 3 frequen-



frequentiorem morbi recursum praverere, nec sine successu tentabatur. Trimestre et plus transierat ab omni febris hujus ictericæ invasione omnino vacuum. Verum enim vero, dum minime de ejus reditu cogitarem, aderat rursus, per cibum dyspeptum largius sumtum evocatus, quem pulsum opinabamur, hostis, tam quoad dolores exquisitos, quam quoad febris violentiam icterique infecuti pertinaciam prioribus omnibus paroxysmis auctior.

Circa hoc tempus dolores artuum inferiorum



teriorum, podagricis haud abfimiles, intercalares periodos non solum notabant, sed ingruentem quoque quemlibet paroxysmum ad æstum usque febrilem comitabantur; sub ipsis autem sudoribus, universum finistrum latus, a femore ad pedis extrema usque sudabat nunquam. (sinister pes præ dextro podagræ olim sedes fuerat primaria). Hinc, quum subesse fortassis collectam denuo materiam aliquam podagricam vel arthriticam naturæque ad hanc expellendam conatus, non sine probabili causa crederetur,



pes uterque aquæ calidæ, fursutibus floribusque sambuci remixtæ, immergebatur sæpius, quin et pannis quoque laneis fricabatur quotidie. Simul, ut robur corpori adderetur, ad perficiendum illud, quod moliri natura videbatur, opus, corticem peruvianum, rhabarbaro nuptum vinoque rhenano aquaque communi incoctum, cui essentia corticum aurantium tartarique solubilis aliquantum accesserat, quater de die agrotus sumsit, eo cum successu, ut licet manifestaverint se leves podagræ renascituræ paroxysmi,

per



per periodos nihilo secius tamen rediret
icterica febris, modo cum, modo sine
doloribus saepe remoraris.

Anno sequente, quum mutare locum
dolores, et a lumbis ad superiorem ab-
dominis partem ascendere viderentur,
varique accederent infimi ventris mo-
tus spasmodici, borborygmi, colicæ, fre-
quentes tenesmi, lumborumque et dorsi
dolores vagi, ideam moverant, de la-
tentibus forte sub larva hac peregrina
moliminibus hæmorrhoidalibus, itaque
et quæ huic scopo facere possent medi-



camenta tam externa quam interna ex pharmaceutico et chirurgico fonte desumpta, per integrum fere annum adhibita sunt; sed et hæc quoque sperato carebant successu. Pergebat tramite solito per paroxysmos febris, cujus solutionem icterus semper excipiebat per aliquot dies constans, sponte dein solutus. Neglectum interea nihil omnino est, quod ad decobstruenda, quæ infarcta jure credebantur, minorum ordinum biliaria hepatica et mesenterica vasa, quod ad solvendam et fundendam tenacem ad con-

cretio-

cretionem forte pronam bilem, quod tandem ad liberandas a fordibus primas vias earumque diversoria aptum ullo modo judicaretur. Hausta sunt ex aperientium classe apozemata per integros menses; vocata in usum tam externum, quam internum, saponacea, continuatus satis diu est tartari solubilis, melle remixti, usus; quin, quam diu per anni tempora licuit, firmato prius per medicamenta appropriata corpore, vel succos herbarum recentes assumsit, vel selecteranas aquas; incassum omnia. Vis itaque



que morbi pertinacia, illoque jam ad-
fuescens æger, remediis jam parcius,
dicta autem tanto strictiori uti cœpit;
sic tamen, ut leni rhabarbarino laxante
claceret subinde intestinalem tubum, mo-
tuque corporis quotidiano languentem
humerum circulum excitaret. Ferre hæc
egregie visum est fatigatum tot remediis
corpus, fueruntque periodi, ubi per qua-
drimestre fere a paroxysmo suo febrili
icterico vixerit immunis. Ridere ergo
subinde per jocum curas nostras medi-
cæque artis adunantiam cœpit vir illu-

stris



Aris suæque naturæ tanto magis prædicare excellentiam indolemque incomparabilem, quæ tanto medicamentorum farragini non succubuerit tota, dicens, fugituum se in posterum cum medico medicamenta omnia et expectaturum a facto, quod per hippocraticam artem non daretur, sanitatem. Neque stabiles fuerunt induciæ hæ infidiosæ; potius insolita recrudescebant vehementia, paroxyismi breviores metiebantur periodos, duplicique jam febre regulariter constabant. Erat ergo hæc cujuslibet invasionis fa-

cies



cies: suboriebatur primum in abdominis inferiori plaga ingratus ægro sensus, non quidem dolorificus, neque gravis, sed peregrina quædam et præternaturalis ægro inexplicabilis sensatio; hanc dolores excipiebant cardialgici, per totum dextrum latus mox distribuendi, exquisitissimi, lacerantes, quos horror sequebatur, dein frigus febrile, sub quo sitis inexplibilis. Restinguebatur hæc potu aquoso tepido, demulcente. Jam æstus sese manifestabat, post semihoram subinde in sudorem profusissimum transiens, sub cuius accessu



accessu post stranguriosos aliquot nixus
urina tandem fluebat copiosa, in prin-
cipio coloris aurantii, mox fusca, spissa,
unctuosa, & icterica, quæ eodem modo
uti et erumpens sudor lintheamina satu-
ratissimo croceo colore tingebat. Simulac
transisse bilem in humorum massam ex
signis his manifestis appareret, somnus
invalebat oppressivus, profundus, co-
matosus, ex quo non nisi longa opera
et ne hac quidem omnino expergeri
poterat. Ad quadrihorium hic ut pluri-
mum protrahebatur, quo finito, hebes
per



per aliquot horas jacebat, postea autem
sensim menti redibat serenitas, quam
tamen hoc ipso tempore erumpens no-
vus, priori simillimus paroxysmus, per
horrorem, frigus, æstum, sudores, so-
mnusque hunc altum jam recensitum
decurrrens rursus fugabat.

Triennium sic et ultra inter recurren-
tes hujus morbi profecto rari et perti-
nacis paroxysmos effluxerat, quum in-
gruente autumnno, veloci nuntio, ut
quantocyus possem ægroto adesse velim,
monerer. Ira præcox febrim incenderat.

Obedi,



Obedii, invenique perillustrem virum
a paroxysmo primo jam finiente defati-
gatissimum. Dolores vehementia sua
omnes, quotquot jam sustinuerat paro-
xysmos, superaverant, propagatique jam
ad ima pectoris penetralia ægrotum ad
extrema usque defatigaverant. Instabat
jam alter, cujus accessum coeruleus un-
guis color renascituriensque in abdo-
mine dolor nuntiabant. Pulsus quum
rangerem, inordinatissimum hunc inve-
ni, tam ratione magnitudinis, quam
oscillationum. Intermittebat ad tertium



vel quantum ictum, modo semel, modo bis, digitique exploratoris omnem sæpe sensum effugiebat. Confusus totus erat. Accedebat his omnibus mira præcordiorum anxietas, palpitatio cordis, animique dejectio visibilis. Occupabat totum corpus rigor. Lacescebant inferiorem ventrem borborygmi. Ergo ruere jam in pejus morbum, maleque totam rem agi manifestum erat. Ego statim ad solvendas illas, quæ in abdomine nidulabantur, partium stricture spasmodicas, ex herbis emollientibus, in

lacte



lacte dulci coctis, quibus saponis veneti
oleique lini una alterave uncia fuerat
adjecta, enema injici curavi, simulque
totum abdomen eodem hoc fetu emolli-
ente involvi, utque simul h. pochon-
drium dextrum lacte dulci, in quo ve-
netus sapo solutus fuerat, fricaretur, sua-
si; oleum autem amygdalinum dulce ca-
lidum, cui aliquot liquoris anodyni Hoff-
manniani guttulas instillaveram, cochlea-
tim ore hauriendum præbui, unde prom-
pta dolorum obmutescentia non solum,
sed et frigoris quoque insequentis feбри-



lis restrictio notabilis celerque ejusdem
in calorem, sudorem et somnum transi-
tus. Quæ post paroxysmum prodibant
fæces gryseum ferebant colorem, inter-
cepti biliferi ductus indices, quibus et
ictericus totius corporis color accedebat
testis. Sopor, ad plures horas protractus,
animi alacritatem non nihil obnubilavit.
Rediere tamen intra paucos dies sub usu
decocti aperientis, blandis solventibus
et analepticis juncti, inclinata corporis
vires, consuetusque vigor. Recludeban-
tur sub continuato emollientium exter-
porum

norum frictionumque usu clausi bilis
meatus, colorque cito corpori redibat na-
turalis. Sic liberum se jam ad longum
tempus a paroxysmo futurum sperabat
æger, quum post decendium eadem, sed
leviori aliquantum febre, a doloribus va-
cua premeretur, quam sexta die rursus
paroxysmus sequebatur, post triduum de-
nuo recurrens. Erat hæc *prima Septem-
bris*. Qui autem subsequenter *tertiam*
hujus mensis *diem* notabat insultus, o-
mnes unquam prægressos atrociora superabat.
Prima vice hic ante prandium hora ma-



tutina undecima invaluit, per omnes notatos gradus intra quinque horas ad sudores usque procedens. Vix autem deferbuerat ille totamque corporis superficiem foeda aurigine tinxerat, quum alter hora quarta pomeridiana superveniret paroxysmus, doloribus ventriculi, cardiæ, totiusque dextri lateris notabilis. Contractus simul spastice ventriculus vanos ad vomitum elicit conatus, urgentesque jam enormiter dolores mirum quantum auxit, sic ut anima fere defecерit. Solvit quidem insequens febrilis sudor

horum



horum vehementiam; mansit tamen post depulsam quoque febrii pulsus irregularis, intermittens, inæqualis, pectoris oppressio, palpitans cor, dejecta mens, ciborumque omnium fastidium. *Die Septembris quinta* circa novam matutinam, statim ac primi spasmodici motus febriiles corpus pervaderent dolorumque circa præcordia prima vestigia sese manifestare sensumque ad stomachi sedem prorepere occiperent, applicata sunt universo abdomini fomenta ex herbis emollientibus cum floribus chamomillæ, sambuci et meli-



loti in lacte dulci coctis; injectum ex
iisdem clysmā, haustumque calide deco-
ctum florum chamomillæ saturatum. Ad
hæc dolores evanescebant brevi, febris
autem tenore solito non mutata perrexit
totaque post octo horas soluta est. Super-
erat et ex hoc paroxysmo pulsus ataxia,
frequensque remissio, palpitationes cor-
dis, anxietas &c, corpusque totum inten-
sa perfundebatur flavedine. Post viginti
novem horarum apuretarum inducias,
in quibus decoctum chamomillæ pro me-
dicina dabatur, sexta mensis die, hora

octava



octava vespertina nova exarsit febris, antecedenti paroxysmo multo quidem mitior, sed totam noctem virum illustrem divexans, doloribus capitis gravativis obtusis signata. Exhibebatur in paroxysmo temperans nitrosus pulvis, cui aliquot liquoris anodyni guttulæ adjiciebantur, unde parum vel nihil auxilii, potius intermissiones pulsuum magis increverunt atque est ominosa pectoris angustia. Deserbuit tandem febris cessavitque omnis humorum æstuans ebullitio. Elu- batur tunc enemate blando emolliente alvus,



involvebatur fotu ex lacte dulci saponato torum, quod dolore obtuso premi pergebat, dextrum latus, simulque in usu remedii resolventis et aperientis continuabatur, quum post quinque liberas a febre horas *septima* Septembris hora decima matutina frigus denuo ingrueret penetrantissimum, ita ut quateret ægroti membra, cumque hoc dolores profundi obtusi in latere dextro, ad cordis scrobiculum usque tendentes, qui tamen simul cum frigore per applicata indefesso labore corpori externo fomenta calida emollientia

brevi



brevi superabantur. Febris interim æstuosa fuit, sitis præter morem nulla; frigoris tempore dolores ægrum fatigabant stranguriosi, non nisi post finitum primum febris stadium soluti. Sudor insequens profusissimus erat cum sopore vere comatoso, omnium medicamentorum applicationem prohibente. Desit tandem hora quinta pomeridiana febris, pulsum post se relinquens inordinatissimum, cordis palpitationes, pectoris angustias, membrorumque debilitatem summam; neque a paroxysmo hoc quicquam respi-



raverat æger, quum media nocte denuo
horrore febrili, sed absque doloribus,
infestaretur. Frigus iterum insigne fuit
et succussiones corporis perquam vehe-
mentes, ad sesqui horam fere perduran-
tes; æstus moderatior sequebatur, et su-
dor copiosissimus. Cessante hoc circa ho-
ram octavam matutinam, pulsus tetigi
cumque mire vacillantem deprehendi et
inordinatum. Dedi jam corticem peru-
vianum primo post paroxysmum mo-
mento qualibet hora ad scrupulum unum
ex emulsione refrigerante. Post quatuor
exhi-



exhibitas doses pulsus ordinatio fieri,
et post sex scrupulos sumtos omnino
in orbitam redire coepit. Siliuit febris,
mensque serenior facta. Exulavit quoque
breui ictericus corporis color, redit ap-
petitus, sumsitque sub vesperam juncu-
lum ex pullo æger. Nox solito quietior fuit,
somnus vero nondum reficiens redierat.
Continuabatur sequenti quoque die in
corticis hujus benefici usu, subque ejus
presidio ob halitum oris foetidissimum,
pulverem laxantem ex rhei granis duo-
decim, digestivo sale remixtum, exhibui,
unde



unde sedes binæ. *Decima* sequenti mensis die, omnibus in melius abire visis, dato consilio ut, uti factum hucusque fuerat, statis horis exhiberetur solita *ganaperidis* dosis, ægrum sub instantis sanationis spe reliqui. Verum aliter res evenit: Nocte enim *undecimam* præcedente hora nona vespertina febris iterum rediit, neque ante tertiam matutinam soluta est. Frigus tamen et æstus insequens decreverant, ut et reliqua morbi symptomata molestiora. Continuabatur post solutum paroxysmum in usu



corticis. Adaperta hac die enemate al-
vus fæces eduxit colore naturali tinctus,
neque et aurigo post hunc insultum cor-
pus foedavit. Pulsus apyrexias tempore
pacatus omnino fuit et ordinatus, vi-
guit appetitus, ministratumque sobrium
licet prandium bene et sine ullo incom-
modo digerebatur. Undecima ipsa Se-
ptembris vacua omnino a febre fuit, sic
ut accedere jam ad tertianæ typum re-
bellis hæc febris videretur. Animus hoc
medicanti addidit, resuscitavitque ægroti
jam projectam spem. Pergebatur in ex-



hibitione peruviani corticis, unde tantum jam evenerat boni. Non tamen hic prohibuit, quominus sub diluculum sequentis diei hora tertia matutina post viginti quatuor liberas omnino a febre horas primi rursus se manifestarent erupturi paroxysmi præcursores, dolores nempe gravativi, totam dorfi spinam pervagantes et lumbago intolerabilis. Frigus, quod sequebatur, breve erat, sed vehemens, calor longior, sudor profusissimus. Frigeris tempore sitis iterum urebat ægrum, inexplibilis, eoque finiente viscidum
gluten,



gluten, tetrum, singularis corrupti odoris, ova putrefacta olens, continuo scera-
tu ex trachea propellebatur; totus autem
paroxysmus intra sex horas integre so-
lutus est. Adhibebatur tempore a febre
vacuo, ut factum hucusque fuerat, fe-
brifugus cortex, ita tamen, ut jam o-
mnī sesquihora drachma semis assumere-
tur. Manente sic eadem remedii exhi-
bendi intra certum tempus quantitate,
doses solum singulæ augebantur, neque
ex hoc speratum tulit effectum: *decima*
enim tertia Septembris hora nona matu-



tina post viginti rursus et quatuor horarum inducias paroxysmus novus accessit, præcedenti omnino similis, tam ratione durationis, quam intuitu evacuationis sub caloris febrilis initium materiæ putridæ graveolentissimæ per serearum continuum levemque tussiculam. In hoc, ultimisque præcedentibus paroxysmis, quum inferiores corporis partes non sudarent, licet reliquum corpus sudoribus diffunderet, balnea pedibus applicare, eaque ad solvendos infimi ventris spasmos, cujuslibet invasionis præcursores, sæpe
repetenda



repetenda fuasi; quin ad minima ingruentis febris indicia ut confestim adhiberentur auctor fui. Pergebatur in peruviani corticis usu, ita tamen, ut prima post solutam febrim dosis ex anatica quantitate rhei et chinæ ad grana quindecim conflaret; id quod ob alvi segnitiam judicabatur necessum. *Die decima quarta*, quum sensationem quandam ingratam febris prænuntiam accusaret æger, tentare subiit mentem, num prævenire alio modo paroxysmum, sicque subigere obstinatissimum hunc morbum liceret. Ex-



hibui itaque hora sexta matutina olei animalis Dippelii guttas quinque et viginti, insequabatur somnus placidus mollis levisque transpiratio; expergescebat hora nona pavidus et febricitabat. Fuerat igitur tempus a febre vacuum novendecim horarum, ipse autem paroxysmus intra quinque horas solvebatur. Finito hoc æger optime habuit, dormivit placide, pulsus et appetitus boni fuerunt, digestio laudabilis; hinc in usu corticis continuabatur. Sequenti die felicior non fuit propinati animalis olei
eventus;



eventus; jam enim tertia hora matutina febris denuo accensa, sex iterum horis anticipans. Non desaveiebant quidem amplius tanta ferocia soliti abdominis præsertim hypochondrii dextri dolores, sed hebes quidam profundus et obtusus doloris sensus hepatis regionem occupans ægrum assiduo vexabat; hinc frequenti enemate fota interna hæc regio, fots quoque superimposito externe lacte dulci totus hic tractus. Ipse hic paroxysmus intra quatuor horas metam suam percurrit. Post septendecim horarum



intervallum media nocte redibat febris,
prioribus similis, intra quadrihorium so-
luta. *Die decima sexta*, quum circa de-
cimam matutinam ex minori et contra-
ctiori pulsu accessionem novam febris
metuerem, theriacam Andromachi ex
haustu vini calidi dedi, visurus, an febrile
frigus sic prævenire liceret. Dormivit
placide ab adhibito pharmaco æger, re-
spiratio pulsusque fuerunt magni, ma-
debat aucta transpiratione corpus, evi-
gilabat statim post duodecimam, susti-
nuitque somnolentus adhuc febris in-
gressum.

gressum. Ipse autem paroxysmus brevior fuit et levior antecedentibus, urina, hodie in febre missa, icterica quamvis fuerit, nullum tamen deposuit, ut solebat, sedimentum. Post febrimꝫ reddita, quum per quinque horas steterit, turbata demum apparuit, nec, nisi post octo integras horas parcum deposuit sedimentum. Hora sexta vespertina rediit febris priori major, intra trihorium tamen soluta; nox reliqua placido somno transiit. Sub meridiem *decimæ septimæ*, cum instantem paroxysmum ex decre-



sciente pulsu, nasi extremi refrigerio, notisque aliis signis suspicarer, unguentum nervinum cum oleo juniperino et the-
rebinthinæ dorso infricui; quo facto ipsam febris eruptionem ad feram ve-
speram retardavi, euntibus interim et re-
deuntibus continuo per corpus horro-
ribus. Redditum hodie lotium levem so-
lum nubeculam post refrigerium osten-
dit. Alvus pulvere rhabarbarino aperta.
Media nocte paroxysmus febrilis erupit
levior et admodum brevis, habuitque se-
multo melius æger dum febricitaret,
quam



quam ante febris eruptionem. *Die octava decima* spinam iterum perfricui et ante paroxysmum ingruentem roob sambuci exhibui ex multo potu calido aquoso. Totum præterea abdomen fotti emolliente involvi, pedibus succupium paravi, sique emollito, quantum licebat, toto corpore, abstersum ægrum tepido commisi lecti calori. Egregie hoc tulit illis ægrotus; sudavit brevi post, et sudans adhuc circa sextam vespertinam febriliter horruit, vehementemque sustinuit paroxysmum, urinam, sudores,



rotumque corpus icterico colore foedantem. Dolores adfuerant nulli, somnus autem secutus est vere comatosus. Dabatur statim post finitum paroxysmum ganaperidis extractum in decocto quinque radicum aperientium solutum saleque resolvente nuptum. Hausit apoze-
matis hujus singulis horis unciam unam, eo cum successu, ut sequenti jam mane hora octava antemeridiana post decem horarum apyrexiam febricitaverit. Soluta paroxysmo inquietus admodum æger fuit, nubila mens, sensusque valde hebetes.



betes. Alvum hac die clyisma aperuit
fæcesque elicuit coloris naturalis. *Die*
vigesima ante diluculum hora matutina
tertia jam rediit febris, qua pulsa in me-
dicamentorum memoratorum usu perre-
ctum, nihilo tamen minus post septem
horarum a febre veniam hora quarta et
dimidia post meridiem a morbo rursus
affligebatur. Paroxysmus hic, sex horas
cum dimidia durans, vires ægri admo-
dum proculcavit. Somnus intercalari
tempore tranquillus fuit et reficiens. *Vi-*
gesima prima unguentum dorso infri-
ctum,



atum, potum calidum copiose exhibitum, continuas abdomini applicatas fomentationes pedumque frictiones et natam inde diapnoën mollissimam elusit pertinacissimus morbus; hora enim ante meridiem nona frigere jam et febricitare incepit, sed sine vel minimis doloribus, aut frigore notabili; insequens vero æstus siccus diutius persistit; hora enim tertia pomeridiana demum in sudorem solutus est. Urina mitescente frigore missa mox subsedit, uti et illa, quæ æstus tempore excernebatur, et post ipsam



piam solutam omnino febriim. Pergebatur
in remediorum præscripto usu, præsens-
que jam aderat hora nona vespertina ho-
stis, ad tertiam matutinam usque agro
incommodus. Notabilis erat hic paroxy-
smus ob nuchæ scapularumque dolores
atrocissimos, frigoris tempore invalentes.

Die vigesima secunda circa nonam matu-
tinam febre jam decubuit. Duravit ad
sesquihoram usque frigus, plus bihori-
um æstus consumsit, protractusque fuit
sudor ad tertiam vespertinam, sub quo
largus iterum materiæ purulentæ putri-



dæ per scretum proventus. Missa hodie
urina vix turbabatur, quum diebus an-
tecedentibus cito præcipitaretur. So-
mnus, qui sequebatur, tranquillus erat et
reficiens; febris autem hora post medi-
am noctem dimidia eundem interrupit;
levior autem hæc prioribus fuit, qua
finita infusum chamomillæ cum salibus
resolventibus exhibebatur. Novus febri-
lis paroxysmus hora post meridiem se-
cunda hujus diei invaluit, frigus tole-
rabile fuit per horulam affligens, æstus
ad quartam usque duravit, sudor quin-

ta absolvebatur. *Vigesima quarta* sub noctem inter tertiam et quartam matutinam febris intersum veterinoso somno ægrotum corripuit, friguerunt manifesto extrema omnia, manus, pedes, nasi apex, solutusque intra trihorium primo in æstum dein in madorem languidum febrilis hic paroxysmus est, absque quod æger ipse comatoso hoc somno evigilaverit. Urina, quam vigil dein misit, bruno colore saturatissimo conspicua, turbata licet, demisit omnino nihil. Alvus hodie clysmate adapertha fæces exhibuit colore naturali



turali tinctas, oculi tamen albuginea, facies, collum, totique humeri arcuati morbi præbuerunt indubitata signa. Post prandium somnus iterum accessit, subque somno diapnoe; quumque hor pomeridiana tertia ex refrigerio extremorum febris reditum auguraretur agrotus, quieti sese dedit, absque quod, quam timuerat, febris erupisset. Rediit tamen post bihorium horror frigusque febrile, secutusque brevi est calor sudorque solitus. Nox ipsa sine febre quidem sed inquieta admodum transiit. Sub
dilucu-

diluculum vigesimæ quintæ pulsus naturali citatior erat magnaque ad somnum proclivitas. Lotium, quod hoc tempore reddidit, circa meridiem turbatum, sedimentum ferius dimisit, ex bruno gryscum. Circa hoc tempus animi serenitas aliquantum rediit, discussaque videbatur mentis hebetudo. Qui apponebatur ex juscule avenaceo citrato coctisque spinachiis cibus, cum appetitu consumtus est. Oris halitus foetorem jam monstrabat terribilissimum, quin et productus sercatus fortiori ex larynge humor purulen-



tus, nauseosissimus fuit. Tardiores al-
vum exhibita rhabarbari pauca grana-
bis aperuerunt. Hora circiter quinta fri-
goris penetrantissimi, corporis interna
pervagantis, sensus ægrum invasit, cum
doloribus regionem hepatis occupanti-
bus, neque tamen partes externæ ad at-
tactum frigus aliquod prodiderunt; pul-
sus vero mire parvus fuit et contractus.
Stadio hoc intra horæ dimidium abso-
luto calor vix notabilis secutus est, pau-
lo post ad madorem transiens, quem
somnia excepit solitus oppressivus. Uri-



na, sub febre missa, omni nota icterica erat. Hora noctis nona, quum agro præsens pulsum deprehenderem naturali multo citatiorem, potiunculam temperantem acidulatam exhibui, qualibet hora reiterandam. Hora matutina secunda post aliqualem dorsum pererrantis frigidioris auræ sensationem dolor ex improvise erupit atrox, lancinans, scindens, totum dextrum latus omnemque epigastricam regionem occupans, adeo vehemens, ut ab ejulatu vix abstinere posset constantis ceteroquin et firmæ mentis



vir. Pulsus ad hæc sensim ex parvo et contracto remittens myurus, sed quam maxime inordinatus fieri cœpit, frigebant extrema, sudorque gelidus unctio-
sus occupabat frontem. Vocatus ego po-
tum theæ calidum cum liquoris anody-
ni aliquot guttis propinavi sine ullo
levamine. Applicabatur toti lateri dolen-
ti fomentum calidum emolliens, neque
et hoc expectationi satisfecit. Injicieba-
tur ejusdem virtutis enema, cui sapo
venetus oleique lini blandi aliquantum
addebatur, verum et ex illo, quamvis

repe-



repetito, nullum levamen. Tandem infusum florum chamomillæ utriusque quantum potui saturatum ad uncias duas, calens, uno haustu exhibui, quod intra quinque horæ minuta dolores compe-
scuit pulsamque orbitæ suæ reddidit, nisi quod naturali frequentior maneret, postquam ad sextam matutinam usque ominosus hic status duraverit. Pulsio hoc paroxysmo tensam nonnihil seu inflatum potius molliter hypochondrium dextrum apparuit et mansit deinceps, sed sine ullo perceptibili fluctuationis alienius



senſu. Soluta poſt bihorium ſponte ſua
alvus excrementa dedit coloris naturalis,
urina autem expulſusque ſudor ab ad-
mixta bile multa intenſe flavebant, ju-
ſculum ex pullo paratum, ſpinachia co-
cta, appoſitaque lactuca capitata cruda cum
appetitu ingerebantur, ipſeque æger ſum-
to hauſtulo vini rhenani, aqua di-
luti, pro morbi ratione optime valuit.
Dormivit placide ad tertiam uſque po-
meridianam, tranſpirabat leviter ſub
ſermone corpus, evigilabat alacris æger, to-
tamque hoc tempore corporis ſuperficiem

foeda



foeda aurigine perfusam mirabatur. Data subinde fuit ad compescendum sanguinis orgasmum mixtura antiphlogistica, auctus tamen nihilo fecius sub vesperam pulsus est, mansitque citatior per integram noctem, quæ continuis jactationibus infomnis consumebatur. *Vigesimæ septimæ* diei matutinæ horæ tranquiliores licet fuerint somnusque placidus accesserit, pulsus tamen febrilis esse perrexit. Datus cum lapidibus cancerorum remixtus rhabarbarinus pulvis, faleque vegetabili nuptus, non quidem alvinam,



sed cutaneam potius excretionem promovit, factusque est saturatior, qui faciem et collum jam ante tinxerat, ictericus color. Urina fere nigra excernebatur, crassumque et copiosum deposuit ad fundum matulae sedimentum. Ceterum tota hæc dies quieta satis transiit, et, si febrem continuam exceperis, satis tolerabilis, uti et insequens nox. *Postridie*, manifestantibus sese iterum doloribus, fomentum sæpe jam probatum emolliens opposui cum fructu. Hora undecima matutina tendi abdomen, et respiratio
per



perquam difficilis esse coepit, opprimebatur pectus, crediitque inquietudo. Pulsus simul parvus reddebatur per varios gradus, mireque contractus. Rigebat totum corpus, faciesque collabebatur tota. Ego extrema perfricare, pedibus lagenam, fervida plenam, ventrique universo fomentum adhibere blandum emolliens, quin clyisma quoque solitum injicere constitui, analepticam insuper ore hauriendam exhibui potiunculam. Continuata et repetita hæc aliquoties per integrum trihorium non prohibuerunt, quo



minus secunda post meridiem hora frigus
erumperet febrile intensum, universale,
cum succussione membrorum violenta, spi-
rituque quam maxime intercluso. Pulsus
iterum adeo contrahebatur, ut digiti
sensum fere effugeret. Linquebatur ani-
mo æger, duravitque dubius hic status
ad tres horæ quadrantes eo gradu, ut de
caloris reditu vix non desperarem. Tan-
dem sine insequente notabili calore
mador secutus est corporis unctuosus
et languidus, quem repente gelu iterum
excepit acre, ad 25 horæ minuta du-
rans,

rans, quo pulso celer a calore ad sudorem transitus fuit, sub cujus eruptione aliqualis symptomatum remissio ipseque somnus secutus. Excreta iterum est sub hoc paroxysmo, partim tussiendo, partim scretu insignis tetri putridissimique puris copia, quæ totam pulmonum substantiam sic implere videbatur, ut suffocationem ægro minaretur, finiente vero paroxysmo ne vestigium quidem harentis vel tantilli puris in pulmonibus restabat; potius liberrima fuit respiratio, tussis nulla, scretus nullus, nullusque omni-



no pectoris vel dolor, vel angustia. Lotium frigore transacto missum, ut ante, ictericum totum fuit, alvas autem, quamquam enemate lacescita, non respondit. Hora octava ferotina pulsus iterum intermittere et turbari coepit, cum anxietate notabili, respiratione laboriosa, pectorisque oppletionem vix credibili, quibus tamen exhibitæ naphthæ vitrioli aliquot guttulæ brevi medebantur. Secutus est sudor non profusus quidem sed æqualis, per bihorium durans, sub quo in semitam suam rediit sensum pulsus. Nox

ipsa



ipsa maximam partem infomnis iterum ducta, si brevem, qui sub diluculum accessit, somnum exceperis. Horis diei vigesima rursus matutinis pulsus celer fuit et frequens, hinc potiunculam suam anti-phlogisticam acidulatam repetiit; decrevit autem jam decima rursus hora pulsus quam maxime, redieruntque anxietates, quas æstus brevi secutus est vehemens, cum pulsu celerrimo, parvo, intermittente, turbatissimo, mentisque alienatione, quæ ad tertiam usque pomeridianam perstitit, quum jam tussis iterum mole-



molestissima prodiret, mediante qua tam
enormis corruptissimi graveolentissimi-
que puris excernebatur copia, ut singula
ne quidem verba proferendi superfuerit
misero facultas. Sudor deinde erumpens
efferam hanc symptomatum ferociam
nonnihil repressit secutusque est somnus
placidus et reficiens. Nox solito tran-
quillior fuit, recurrentibus tamen hora
tertia matutina *trigesimæ diei* motibus fe-
brilibus. Frigus leve erat, solumque
interiora pervasit, æstus quoque obser-
vabatur minor; excreta tamen iterum



est materiæ purulentæ olidissimæ stupenda quantitas. Alvum a biduo siccam, frustra adhibito ad hunc finem potu tamarindinato, injectum enema aperuit. Hora post meridiem quinta febris nova exarsit, prioribus fortior. Opplebatur mire pectus a materia putrida, foetidissima, quam ob virium defectum jam non nisi difficillime excrevit. Pulsus simul maximopere intermisit summæque præcordia presserunt anxietates. Tandem æstus sequebatur, pulsuum ataxia comitatus, qui ad septimam usque vespertinam



nam durabat, quum sudor exprimere-
tur unctuosus, gelidus, manente respi-
ratione admodum anhela. Rauca post
hunc paroxysmum facta vox est, æru-
mosaque deglutitio. Defecerunt quam
maxime vires, neque tota nocte rediit
in ordinem pulsus. Qui subsequen-
tur interdum somnus, turbulentus o-
mnino erat mentisque alienationibus in-
terpolatus. Crescebat sub diluculum
pectoris angustia et anxietas ominosa,
nataque est ex improvise continua va-
na et inanis spiritum vix non omnino



Intercludens tussiculatio. Vitalem auram
inhians incassum se aperitabat improbo
labore pectus. Ardebant incendio præ-
cordia, potumque, quem ad restin-
guendam, quæ maxime urebat, suum,
efflagitabat, reclusit nescium aperiri gut-
tur. Obruebat aëreos pulmonum folli-
culos sæpe jam memorata, sub febrium
paroxysmis huc delata materia putridis-
sima, oppressiones creans impossibiles
fando. Turbulenti sub cavis orbitis ro-
tabant et pulverulenti oculi, frustra cir-
cumspicientes auxilia, anxiusque miser



tendebat in adjumentum circumstantibus manus. Siluit ad tantum periculum pulsus, sui que officii immemor palpitabat cor. Reditum quidem aliquoties tentabat tremens in carpo arteria, sed vano nixu. Exhibita interim guttatum interne analeptica applicataque externe fugientem revocavere ad tempus animam, evacuabatur lente incredibilis corruptissimi puris copia, ad libras usque, sicque per varia rerum discrimina et hoc nycthemeron transiit; donec tandem, crescentibus sub vesperam et superantibus

bus



bus ægri vires symptomatibus, succubuerit circa mediam noctem suffocatus a delato ad pulmones pure ægrotus. Hic exitus fuit lascivientis in viro hoc pertinacissimi morbi, cujus causam in cadavere rimari, roganti non licuit.

Epierisin addidi nullam, quum patere hanc ex ante dictis sufficienter credam, nullaue hujus morbi historia scopo præfixo jam sufficiat et datæ sponfioni.



Emendanda

Pag 39. lin. 2. atinosphæram. p. 64. l. 9.
 mansit, p. 88. l. 9. ægrotantium. p. 89. l. 8.
 solus. p. 97. l. 11. duplici. p. 104. l. 5. de-
 pascens. p. 112. l. 12. habita. l. 13. cy-
 stitidem. p. 138. l. 1. symptomata. l. 8.
 Mackitrick. p. 139. l. 8. præsentissimum.
 p. 147. l. 9. constet. p. 178. l. 7. labo-
 rantem. p. 215. l. 8. deleatur *hujus*. p.
 222. l. 6. morbo adhibita. p. 236. l. 4.
 consultationibus. p. 240. l. 2. hic. p. 242.
 l. 6. Amstelodamensis. p. 255. l. 1. dif-
 ferre. p. 276. l. 3. extrema. p. 330. l. 3.
 perillustis. p. 331. l. 7. amicis. p. 332.
 l. 12. irritos. p. 338. l. 7. profunde. p.
 373. l. 9. interne. p. 384. l. 5. hora. p.
 390. l. 13. totamque.



15340

LS



